

Peroperativ temperaturmätning

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin

Bakgrund och syfte

Inom AnOpIVA/SU finns en gemensam policy om vilka patienter som ska temperaturmonitoreras peroperativt.

Kontroll och övervakning av kroppstemperaturen är en viktig patientsäkerhetsaspekt för patienter som behöver genomgå operativ procedur. Kroppstemperaturen följs även upp i nationella perioperativa register (SPOR) som kvalitetsindikator.

Patienter med för låg eller förhöjd kroppstemperatur har en ökad risk för perioperativa komplikationer.

Utförande

Temperaturmätning av samtliga patienter som igenomgår ingrepp/narkos med planerat operationstid >30min.

Kroppstemperaturen mäts vid op-start och op-slut vid samtliga ingrepp som har planerat operationstid >30min.

Registreringen görs i avsett flik i Orbit. Mätningen igenomförs med bästa tillgängliga metoden, helst så centralt som möjligt

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i journalsystemet om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från styrdokumentet rapporteras i MedControl PRO.

Uppföljning

Uppföljning av införda data ska göras kvartalsvis för att ge återkoppling till respektive operationsenhet

Arbetsgrupp

Lena Sand Bown SC

Christopher Lundborg SC

Ann-Kristin Rimbe Verksamhetsutvecklare

Källförteckning

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska, Operation 6 Sahlgrenska, Operation 4 Sahlgrenska, Arkiv och informationsstruktur, Anestesi 5 Sahlgrenska, Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Lena Sand Bown, (lensa13), Sektionschef

Granskad av: Ann-Kristin Rimbe, (annri16), Verksamhetsutvecklare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-3356

Version: 1.0

Giltig från: 2025-09-01

Giltig till: 2027-09-01