

Gäller för: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal

Giltig från: 2024-11-29

Innehållsansvar: Hanna Cederqvist, (hanol12), Sektionsledare

Giltig till: 2026-11-29

Godkänd av: Hanna Cederqvist, (hanol12), Sektionsledare

Heparin, koksalt vid kärlkirurgi – blandning, Op 1

Bakgrund och syfte

Blandning av Heparin/koksalt för spolning av ven och artär vid kärlkirurgi.

Utförande

Preparat	Injektion Heparin 5 000 IE/ml
Läkemedelsdos	5 000 IE Heparin (1 ml)
Spädningsmedel	500 ml NaCl 9 mg/ml
Koncentration	10 IE/ml

Koppla NaCL-påsen till sterilt droppaggregat och trevägskran samt spruta med luerlockfattning. Sprutan ska vara märkt med NaCL + Heparin.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på enheten.

Uppföljning

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet.

Arbetsgrupp

Valdone Bernataviciene, specialistläkare Operation 1 Mölndal, Område 3

Hanna Cederqvist, sektionsledare Operation 1 Mölndal, Område 3

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal

Innehållsansvar: Hanna Cederqvist, (hanol12), Sektionsledare

Godkänd av: Hanna Cederqvist, (hanol12), Sektionsledare

Dokument-ID: SU9805-1593997-354

Version: 5.0

Giltig från: 2024-11-29

Giltig till: 2026-11-29