

Total spinalanestesi - åtgärder, AnOpIVA Mölndal

Förändringar sedan föregående version
Ny rutin.

TOTAL SPINALANESTESI – ÅTGÄRDER

(med isobar Marcain spinal)

1. Larma!	Tillkalla narkosläkare
2. Luftväg & andning	100 % O ₂ Överväg att: Ventilera med mask - intubera
3. Cirkulation	Lägg patienten plant, ev. Trendelenburg. Snabb infusion av kristalloid västka. <u>Vid bradykardi</u> <ul style="list-style-type: none">• Atropin 0,5–1,0 mg iv <u>Vid lågt blodtryck</u> <ul style="list-style-type: none">• Inj Efedrin 5–10 mg iv, upprepa vb.• Inj Fenylefrin 50–100 µg iv. eller Inj Noradrenalin 0,01 mg/ml 1–2 ml iv• Inj Adrenalin 10–50 µg iv vid uttalad chock• Infusion Noradrenalin (konc 0,1 mg/ml) <u>Vid cirkulationsstillestånd</u> Påbörja HLR
4. Övervakning	BT, puls, SpO ₂ , EKG, urin
5. Fortsatt vård	<ul style="list-style-type: none">• Håll patienten sederad/sövd om intuberad.• IVA tills blocket släppt och patienten stabil.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal

Innehållsansvar: Dragana Sesevic, (drama), Överläkare

Godkänd av: Karin Löwhagen, (karer20), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-3591

Version: 1.0

Giltig från: 2025-12-02

Giltig till: 2027-12-02