

Immunsuppression vid multivisceral transplantation - Basprotokoll

Tidpunkt	Steroider (mg)	Takrolimus konc (ng/ml)	MMF	Basiliximab
Preoperativt				
Dag 0 före påsläpp	1000 mg x 1			20 mg
Dag 0 postop		0,05 mg/kg x 2	1000 mg	-
Dag 1	50 mg x 2	Konc 10-15	1000 mg x 2	-
Dag 2	40 mg x 2	”	”	-
Dag 3	30 mg x 2	”	”	-
Dag 4	20 mg x 2	”	”	20 mg
Dag 5	15 mg x 2	”	”	
Dag 10	20 mg x 1	”	”	
1-3 mån	15 mg x 1	”	”	
3-6 mån	10 mg x 1	Konc 5-10	”	
6-12 mån	5 mg x 1	”	nedtrappning	

Steroider:

Solu-Medrol 1000 mg i.v. före påsläpp peroperativt. Postoperativt ges initialt iv beredning Precortalon / Prednisolon. Efter stabil graffunktion görs övergång till Prednisolon per os.

Basiliximab:

Induktion 20 mg iv peroperativt samt på dag 4 postoperativt.

Takrolimus

Initialt ges Takrolimus i form av oral suspension i jejunalsond. Vid stabil graffunktion kan övergång göras till Takrolimus tablett.

MMF

Ges initialt som iv beredning. Vid stabil graffunktion övergång till po beredning.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Transplantationscentrum

Innehållsansvar: Ulrika Skogsberg Dahlgren, (ulrsk1),
Överläkare

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-3669

Version: 2.0

Giltig från: 2026-03-26

Giltig till: 2028-03-26