

# Immunsuppression vid multivisceral transplantation med ökad immunologisk risk och vid isolerad tarmtransplantation

Tidpunkt	Steroider (mg)	Takrolimus konc (ng/ml)	MMF	Basiliximab	Rituximab
Preoperativt					
Dag 0 före påsläpp	1000 mg x 1			20 mg	375 mg/m <sup>2</sup>
Dag 0 postop		0,05 mg/kg x 2	1000 mg	-	
Dag 1	50 mg x 2	Konc 10-15	1000 mg x 2	-	
Dag 2	40 mg x 2	”	”	-	
Dag 3	30 mg x 2	”	”	-	
Dag 4	20 mg x 2	”	”	20 mg	
Dag 5	15 mg x 2	”	”		
Dag 10	20 mg x 1	”	”		
1-3 mån	15 mg x 1	”	”		
3-6 mån	10 mg x 1	Konc 5-10	”		
6-12 mån	5 mg x 1	”	nedtrappning		

## Steroider:

Solu-Medrol 1000 mg i.v. före påsläpp peroperativt. Postoperativt ges initialt iv beredning Precortalon / Prednisolon. Efter stabil graftfunktion görs övergång till Prednisolon per os.

**Basiliximab:**

Induktion 20 mg iv peroperativt samt på dag 4 postoperativt.

**Takrolimus:**

Initialt ges Takrolimus i form av oral suspension i jejunalsond. Vid stabil graffunktion kan övergång göras till Takrolimus tablett.

**MMF:**

Ges initialt som iv beredning. Vid stabil graffunktion övergång till po beredning.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Transplantationscentrum

**Innehållsansvar:** Ulrika Skogsberg Dahlgren, (ulrsk1),  
Överläkare

**Godkänd av:** Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-3670

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2026-03-26

**Giltig till:** 2028-03-26