

Gäller för: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal

Giltig från: 2025-06-04

Innehållsansvar: Karin Kleiven Thiringer, (karth5), Överläkare

Giltig till: 2027-06-04

Godkänd av: Karin Löwhagen, (karer20), Verksamhetschef

Magnesium vid hjärtarytmi, IVA Mölndal

Förändringar sedan föregående version

Inga ändringar sedan föregående version.

Bakgrund och syfte

Beredning och dosering av magnesium vid hjärtarytmi.

Utförande

Styrka

Infusionsvätska 1 mmol/ml.

Indikation

Allvarliga ventrikulära arytmier speciellt av typ torsade de pointe.

Beredning/dosering

20 ml Magnesium 1 mmol/ml sätts till 100 ml NaCl alt Glucos 5% och ges som infusion på upp till 4 timmar beroende på arytmis allvarlighetsgrad (minimumtid 20 min).

Målkoncentration 0,7 – 1,9 mmol/L.

Kan ges i perifer ven.

Kontrollera S-Mg senast påföljande dag efter Mg-tillförsel.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal

Innehållsansvar: Karin Kleiven Thiringer, (karth5), Överläkare

Godkänd av: Karin Löwhagen, (karer20), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-414

Version: 9.0

Giltig från: 2025-06-04

Giltig till: 2027-06-04