

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad
Innehållsansvar: Jonas Grevsten, (jongu5), Överläkare
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-14

Giltig till: 2026-05-14

Alteplas (Actilyse)

Revideringar i denna version

240229 Läkemedel för lokal trombolys ordineras i Meliors läkemedelsmodul av kärllirurg. Länkat till styrdokument.

210705 Förtydligande av administrering och dokumentation

Syfte

Säkerställa att Alteplas (Actilys) administreras korrekt till postop-och intensivvårdspatienter.

Arbetsbeskrivning

Läkemedelsbeskrivning

ATC – kod: B01AD02

Actilyse® pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning.
Selektivt trombolytiskt medel.

Indikationer

Trombolys generellt eller lokalt.

Kontraindikation/observandum

Riskfaktorer för blödningar. Se FASS.

Biverkningar

Blödning.

Interaktion

Behandling med annan antikoagulantia och ACE-hämmare.

Beredning för infusionslösning

- Ampull I och II blandas enligt instruktion i förpackningen till en styrka av 1 mg/ml. Denna lösning används för generell trombolys.
- För lokal trombolys späds läkemedlet vidare genom att Alteplas 1mg/ml 10 ml blandas med NaCl 9mg/ml 40 ml, vilket ger styrkan 0,2mg/ml.

Administrering, dosering och dokumentation

- **Generell** trombolys: Alteplas 1mg/ml. Dos enligt ordination i Meliors läkemedelsmodul, ges intravenöst. Administrerade doser signeras i Meliors läkemedelsmodul.
- **Lokal** trombolys i extremitetsartär: Alteplas 0,2mg/ml. Doser enligt ordination från kärlkirurg i separat protokoll, ges i arteriell kateter märkt från röntgen. Läkemedel ska även läggas in som en PM-ordination i Melior av kärlkirurg, i första hand via ordinationsmall ("AOI/S Inf Lokal trombolys Alteplas/Heparin"). Administrerade infusionshastigheter dokumenteras på dygnsjournalen och given dos i mg inför varje röntgenkontroll på protokoll "Trombolys-behandling".

Övrigt

Vanligtvis kombinerat med infusion Heparin som går samtidigt i separat skänkel vid lokal trombolys eller startas senare intravenöst vid generell behandling. Se även styrdokument [Trombolys perifert Postoperativ vård](#) .

Förvaring/hållbarhet

Efter beredning bör vätskan användas omedelbart.

Hållbart 8 timmar i rumstemperatur, 24 timmar i kylskåp.

Ljuskänsligt, förvaras i originalförpackningen.

Relaterad information

FASS.se för förskrivare.

[Lungemboli, högrisk](#)

[Trombolys perifert Postoperativ vård](#)

Kunskapsöversikt

FASS.se för förskrivare.

Granskare/arbetsgrupp

Erika Wanne Instruktor PIVA 22 och Postop 95, AnOpIva Omr 5 SU

Lotta Börjesson Instruktor CIVA, AnOpIVA Omr 5 SU

Philippa Joersjö Specialistläkare, AnOpIVA, Omr 5 SU

Ulla Sandberg Läkemedelsansvarig Sjuksköterska CIVA AnOpIVA, Omr 5 SU

Anne Cervin Vårdenhetsöverläkare, Kärlkirurgi, Omr 5 SU

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Postoperativ vård Sahlgrenska, Läkare kärkirurgi, Central intensivvårdsavdelning, Avdelning 95B postoperativ vård, Avdelning 95A postoperativ vård, Avdelning 22 postoperativ intensivvård

Innehållsansvar: Jonas Grevsten, (jongu5), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-796

Version: 11.0

Giltig från: 2025-04-14

Giltig till: 2026-05-14