

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Rutin

Gäller för: Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska, Verksamhet
Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Område 5
Innehållsansvar: Mathias Konkel, (matko3), Överläkare
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-11-14

Giltig till: 2027-11-14

Anestesimetoder och premedicinering elektiva Ortopediska ingrepp Operation 1/8 – anestesirutin

Förändingar sedan föregående version

250926 Liten rygg sövs med Propofol/Remifentanil och Ketanestbolus 0.2mg/kg ges innan hudincision.

Tumör- mindre ingrepp, mjukdelskirurgi – Oxycontin borttaget från premedicinering.

251113 Dekompression, ländrygg >2 nivåer klassas som stor rygg.

Anestesimetoder och premedicinering elektiva ingrepp Operation 1/8**OBS 2 sidor!**

Ryggortopediska ingrepp	Sevo/ Fentanyl	Propofol/ Remifentanil	EDA	Spinal	Ketanest	Övrigt	Premed
Liten rygg - endoskopiska ingrepp		X			bolus	Undvik muskelrelax.	P+O+COX+Bet+Ond
Liten rygg - diskbråck öppen		X			bolus		P+O+COX+Bet+Ond
Liten rygg - dekompression, ländrygg 1-2 nivåer		X			bolus		P+O+COX+Bet+Ond
Liten rygg - foraminotomi		X			bolus		P+O+COX+Bet+Ond
Liten rygg - ACDF 1-2 nivåer		X			bolus		P+O+COX+Bet+Ond
Liten rygg - främre lumbal fusion 1-2 nivåer.		X			bolus		P+O+COX+Bet+Ond
Stor rygg - dekompression, ländrygg >2 nivåer	X				ev bolus/inf		P+O+GAB
Stor rygg - bakre fusion	X	vid neurostimulering			ev bolus/inf		P+O+GAB
Stor rygg - främre fusion lumbal/cervikal 3 nivåer	X	vid neurostimulering			ev bolus/inf		P+O+GAB
Stor rygg - korpektomi, osteotomi	X	vid neurostimulering			ev bolus/inf		P+O+GAB
Stor rygg - trauma, infektioner	X	vid neurostimulering			ev bolus/inf		P+O+GAB
Stor rygg - tumör	X	vid neurostimulering			ev bolus/inf		P+O+GAB
Stor rygg - reoperationer	X	vid neurostimulering			ev bolus/inf		P+O+GAB
Skolios idiopatisk		X		perop		Ej långverkande opioid inom 20h från morfin-spinal	Enligt ERAS-rutin
Skolios neuromuskulär		X	EDA alt mo spinal av operatör		ev bolus/inf	Ej långverkande opioid inom 20h från ev. morfin-spinal	Individuell
Alltid TIVA Propofol/Remifentanil vid neurostimulering!							

Övriga ortopediska ingrepp	Sevo/ Fentanyl	Propofol/ Remifentanil	EDA	LMA	Övrigt	Premed
Thoraxväggsresektion inklusive revben		X	X			P+O
Sacrumamputation	X		X			P+O
Hemipelvektomi	X		X			P+O
Mutars protes - rekonstruktionsprotes knä/höft	X		X			P+O
Ben förlängning	X		X ^{ev}			P+O
Tumör-mindre ingrepp, mjukdelskirurgi		X		X		P+COX+Bet+Ond
Tumör-stora ingrepp, skelettkirurgi, proteskirurgi	X		X ^{alt. blockad}			P+O

Ord= Ordinarie smärtlindring - viktigt att pat får denna!

P=Paracetamol O=Oxycontin Bet=Betapred Ond=Ondansetron GAB=Gabapentin COX=Arcoxia alt. ev. Dynastat i slutet av operationen efter diskussion med operatören.

Tänk på ålder/vikt och sedvanliga kontraindikationer. Avsteg från premedicinering eller narkosform görs på medicinsk indikation t.ex. hjärtsjukdom, långvarig smärta, svår luftväg, PONV, obesitas.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-
Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Område 5

Innehållsansvar: Mathias Konkel, (matko3), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-806

Version: 9.0

Giltig från: 2025-11-14

Giltig till: 2027-11-14