OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska
Giltig från: 2026-10-08
Giltig till: 2028-10-08
Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska
Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

BAHA OP 7 (AN)

Revideringar i denna version

Uppdatering av layout enligt SOFIA-STY mall. Tillägg av temprutin under rubrik *Temp*.

Patient/Indikation

Patienter med hörselnedsättning. En fixtur och distans sätts fast för senare fäste av hörapparat.

Op. tid <60 min

Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib.

Enl. RUTIN Premedicinering Operation 7 (vgregion.se) och Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 (vgregion.se)

Anestesi

Enl. RUTIN Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 (vgregion.se)
Vuxen: Intravenös anestesi – TIVA i TCI-mode med Propofol + Remifentanil + BIS/Sedline. Ev. Muskelrelax*
Barn: Anestesi enl. RUTIN TIVA-mode barn 15-30 kg (AN).pdf. Ev. Muskelrelax* + BIS/Sedline.

Luftväg

Oralintubation, tuben fästs på motsatt sida av operationsområdet.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Trombosprofylax

Se RUTIN Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi (vgregion.se) Eller enl läk. Ord.

Markering av op-område

JA.

Prover/Undersökningar

Se RUTIN Preoperativ provtagning och utredning Op 7 (vgregion.se)

Positionering

Ryggläge enl. RUTIN Upplägg ryggläge av vuxen patient (vgregion.se). Lägg huvudet åt sidan med operationssidan uppåt.

Temp

Aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning om operationstid >1h Däremot måste alltid en bedömning göras utifrån patientstatus och ingrepp enl.
RUTIN Perioperativ temperatumätning.pdf

KAD/Bladderscan

Ej aktuellt med KAD när operationstid är <60 min. Dock ska alltid urinblåsan kontrolleras enl. RUTIN Blåsövervakning perioperativt (vgregion.se). Om det blir aktuellt med tappning ska det utföras enl. RUTIN KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa (vgregion.se).

Postoperativ smärtbehandling

Klonidin vb. Undvik opioider. Barn: Klonidin, Dynastat® och Perfalgan.
PONV-profylax vb. Enl. RUTIN Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 (vgregion.se).

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Marlene Darell, Operationssjuksköterska, Operation 7, Område 5, AN/OP/IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, Område 5, AN/OP/IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Erik Belfrage, t.f. Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, Område 5, AN/OP/IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Arvid Sjödin, Anestesisjuksköterska, Operation 7, Område 5, AN/OP/IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-876

Version: 5.0

Giltig från: 2026-10-08

Giltig till: 2028-10-08