

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7

Giltig från: 2025-02-18

Sahlgrenska

Giltig till: 2027-02-18

Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

BAHA OP 7 (AN)

Revideringar i denna version

Tillägg under rubrik Temp.

Ändring anestesisform barn till enl. rutin.

Uppdaterat information i länkade rutiner.

Patient/Indikation

Patienter med hörselnedsättning. En fixtur och distans sätts fast för senare fäste av hörapparat.

Op. tid <60 min

Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib.

Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](#) och [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

Anestesi

Enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

Vuxen: Intravenös anestesi – TIVA i TCI-mode med Propofol +

Remifentanil + BIS/Sedline. Ev. [Muskelrelax*](#)

Barn: Anestesi enl. RUTIN [TIVA-mode barn 15-30 kg \(AN\).pdf](#). Ev.

[Muskelrelax*](#) + BIS/Sedline.

Luftväg

Oralintubation, tuben fästs på motsatt sida av operationsområdet.

Trombosprofylax

Se RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi \(vgregion.se\)](#) Eller enl läk. Ord.

Markering av op-område

JA.

Prover/Undersökningar

Se RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning Op 7 \(vgregion.se\)](#)

Positionering

Ryggläge enl. RUTIN [Upplägg ryggläge av vuxen patient \(vgregion.se\)](#).
Lägg huvudet åt sidan med operationssidan uppåt.

Temp

Enl. [Temperaturmätning Perioperativt OP 7 \(AN\)](#). Ej aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning om operationstid <1h generellt (däremot måste alltid en bedömning göras utifrån patientstatus och ingrepp).

KAD/Bladderscan

Ej aktuellt med KAD när operationstid är <60 min. Dock ska alltid urinblåsan kontrolleras enl. RUTIN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#). Om det blir aktuellt med tappning ska det utföras enl. RUTIN [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittert tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#).

Postoperativ smärtbehandling

Klonidin vb. Undvik opioider. Barn: Klonidin, Dynastat® och Perfalgan.

PONV-profylax vb. Enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#).

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Marlene Darell, Operationssjuksköterska, Operation 7, Område 5, AN/OP/IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, Område 5, AN/OP/IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Erik Belfrage, t.f. Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, Område 5, AN/OP/IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Arvid Sjödin, Anestesisjuksköterska, Operation 7, Område 5, AN/OP/IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25),
Anestesisjuksköterska

Granskad av: Arvid Sjödin, (arvsj1), Sektionsledare, Christopher
Lundborg, (chrlu15), Sektionschef

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-876

Version: 4.0

Giltig från: 2025-02-18

Giltig till: 2027-02-18