

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7

Giltig från: 2024-12-20

Sahlgrenska, Område 5

Giltig till: 2026-12-20

Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

# Orofaryngoskopi / Orofaryngoskopi med TOS, OP 7 (AN)

## Revideringar i denna version

Ändrat förkortning från TOUSS (transoral ultrasonic surgery) till TOS (transoral surgery).

## Patient/Indikation

Orofaryngoskopi är en undersökning av orofarynx. Indikationen är ofta förändringar i orofarynx, och ibland görs även biopsier eller större resektioner i samband med malignitetsutredning. TOS (transoral surgery) är en endoskopisk metod för att ta biopsier eller göra resektioner.

**Op. tid 15 – 60 min.**

## Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib.

Se RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](https://vgregion.se)

Se RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](https://vgregion.se)

## Anestesi

Enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](https://vgregion.se).

TIVA med Propofol och Remifentanil + BIS/Sedline. Muskelrelaxation för intubationen alt. Lidokainspray 4% i larynx.

## Luftväg

Se RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

### 1) Oral intubation

Vid orofaryngoskopi utan TOS, rådfråga operatör om oral intubation är möjlig.

### 2) Nasal intubation

Alltid nasalintubation vid orofaryngoskopi med TOS. Vid nasalintubation sprayas Lidokain-Nafazolin i båda näsborrarna inna sövning. Rådfråga operatör om denne önskar lägga tamponad innan sövning. Tamponad kan minska risk för blödning peroperativt vilket kan försvåra undersökningen.

## Förväntade kritiska moment

I samband med att operatören sätter ner munspärren bör man vara observant på att inte tuben knickas, med höga toptryck och ventilationsproblem som följd.

Titta ner med laryngoskopet innan extubation och kontrollera att det inte blöder från tungan eller munbotten. Lyft upp huvudet så att eventuellt blod som ansamlats i pharynx rinner fram och kan sugas bort. Om blödningen ej avstannat, kontakta operatören.

## Trombosprofylax

Se RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi \(vgregion.se\)](#)

## Prover/Undersökningar

Enl. RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning Op 7 \(vgregion.se\)](#)

## Temp

Ej aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning om operationstid <1h (däremot måste alltid en bedömning göras utifrån patientstatus och ingrepp)

## Positionering

Ryggläge enligt RUTIN [Upplägg ryggläge av vuxen patient \(vgregion.se\)](#)

## KAD / Bladderscan

Då operationstid är <3h så är det inte aktuellt med KAD, se RUTIN [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermitt tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#) Bladderscan och blåstappning följs enl. RUTIN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#).

## Postoperativ smärtbehandling

Klonidin och ev. Oxikodon.

PONV-profylax enligt RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

## Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs.

Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

## Granskare/arbetsgrupp

Marlene Darell, Operationssjuksköterska, Operation 7, AnOpIVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Arvid Sjödin, Anestesisjuksköterska, Operation 7, AnOpIVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Luaay Aziz Överläkare, Verksamhet Öron-, Näs- och Halssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård  
Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska, Område 5

**Innehållsansvar:** Hanna Davidsson, (handa25),  
Anestesisjuksköterska

**Granskad av:** Arvid Sjödin, (arvsj1), Sektionsledare, Luaay Aziz,  
(luaaz2), Sektionschef

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-890

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2024-12-20

**Giltig till:** 2026-12-20