

Gäller för: Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska, Operation 1 och 8 Sahlgrenska,
Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska
Innehållsansvar: Peter Larsson, (petla35), Överläkare
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-09-11

Giltig till: 2026-09-11

Bridion® - Sugammadex

Förändringar sedan föregående version

240814 – Förnyad disposition. Förändrat utseende på tabell för omedelbar reversering.

Bakgrund

Doseringstabell för Bridion® (sugammadex) vid reversering av neuromuskulär blockad inducerad med rokuronium (Esmeron®).

Arbetsbeskrivning

Läkemedelsbeskrivning: Bridion® (sugammadex) injektionsvätska 100 mg/ml, ampullstorlek 2 ml (=200 mg).

Dosering: 16 mg/kg

Administrering: Snabb intravenös bolusdos

Doseringstabell (avrundad) för omedelbar reversering

Vikt kg	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
Dos (mg)	600	800	950	1100	1300	1450	1600	1800	1900	2000
Dos (ml)	6	8	9,5	11	13	14,5	16	18	19	20

Normalreversering neuromuskulär blockad med rokuronium.

Vid 0 TOF, men där återhämtningen åtminstone har nått 1 – 2 Post Tetanic Count (PTC) rekommenderas en dos av sugammadex på 4mg/kg. (PTC får endast utföras vid 0 TOF)

En dos av sugammadex på 2mg/kg rekommenderas vid spontan återhämtning vid återkomsten av 2 TOF

Kunskapsöversikt

Fass.se

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska, Operation 1 och 8
Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Peter Larsson, (petla35), Överläkare

Granskad av: Peter Larsson, (petla35), Överläkare, Johan Teandersson,
(johte5), Instruktör

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-905

Version: 11.0

Giltig från: 2024-09-11

Giltig till: 2026-09-11