

Gäller för: Transplantationscentrum

Innehållsansvar: Marie Felldin, (marfe13), Överläkare

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-09-02

Giltig till: 2027-09-02

ABO-inkompatibel njurtransplantation, förberedelse på hemortssjukhuset

Inför blodgruppsinkompatibel njurtransplantation med levande givare:

1. Tag förnyat korstest mellan donator och recipient drygt 1 månad före operationsdag. (Obs! Före rituximab-infusion!).
2. Tag även nya blodgrupps-antikroppstitrar (Antikroppar mot donatorns blodgrupp)
3. Ge en dos rituximab i.v. 375mg/kvm kroppsytan enl separat PM. c:a 30 dagar före operationsdagen.
 1. Starta behandling med T. Mykofenolatmofetil 1 gram x2 med start 10 dagar före planerad operation..
4. Pat skall ha välfungerande dialysaccess (AV fistel/graft eller CDK) inför immunadsorptionsbehandling när patienten läggs in på Transplantations-centrum.

[Länk till PM Mabthera>>>](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Transplantationscentrum

Innehållsansvar: Marie Felldin, (marfe13), Överläkare

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-94

Version: 11.0

Giltig från: 2025-09-02

Giltig till: 2027-09-02