

Gäller för: Operation 7 Sahlgrenska

Giltig från: 2026-05-29

Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2028-05-29

Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

# Cochleaimplantat vuxen OP 7 (AN)

## Revideringar i denna version

Uppdaterad mall enligt STY-SOFIA. Tillägg av Temprutin under rubriken *Temp*.

## Patient/Indikation

Cochleaimplantat (CI). Vid indikationen dövhet.

Hörselimplantatet opereras in bakom örat och går förbi den skadade delen av örat och stimulerar hörselnerven direkt.

Cochleaimplantat på barn, var god se *METODKORT*

[Cochleaimplantat anestesi barn](#)

**Op. Tid <3 h för en sida <6 h bilateral**

## Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib

Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](#) och [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

## Anestesi

Intravenös anestesi TCI; Propofol + Remifentanil + Lidokainspray 4% i larynx. BIS/Sedline. Använd **ej** N2O.

Relaxantia: Ej enl. Rutin. I de fall muskelrelaxantia ges i samband med induktion skall ingen påfyllnadsdos ges för att möjliggöra nervstimulering.

## Luftväg

Oral intubation, tuben fästs på motsatt sida av operationsområdet.

## V-sond

NEJ.

## Trombosprofylax

Se *RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi](#)*. Eller enl läk. Ord.

## Antibiotikaprofylax

JA enl. *RUTIN [Antibiotikaprofylax i samband med operation](#)*.  
Eller enl läk. Ord.

## Markering av op-område

JA

## Prover/Undersökningar

Enl. *RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning](#)*. Eller enl läk.  
Ord.

## Blod

Blodgruppering: NEJ

Bastest: NEJ

Enl. *RUTIN [Blodgruppering, bastest och beställning av blodpåsar inför kirurgiska ingrepp](#)*. Eller enl läk. Ord.

## Uppläggning

Ryggläge, huvudet åt sidan, blodtrycksmanchett på motsatt sida där kirurgen ska operera. Armen på samma sida som ska opereras bäddas in enligt *RUTIN [Upplägg ryggläge av vuxen patient](#)*.  
(Under rubrik Specifikt upplägg).

## Vätskor

Kristalloider

## KAD/Bladderscan

Kan vara aktuellt med KAD om op.tid >3h. Ytterligare bladderscan bör göras peroperativt då ingreppets art kan ge upphov till ökad diures. Tappning/KAD utförs enl. *RUTIN - [KAD - inläggning av](#)*

[kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa \(vgregion.se\).](#)

## Temp

JA. Kan bli aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning r/t op.tiden (en bedömning måste alltid göras utifrån patientstatus och ingrepp). Enligt RUTIN [Temperaturmätning peroperativt OP 7.pdf \(vgregion.se\)](#)

## Postoperativ smärtbehandling

Klonidin vb. Undvik opioider.

## Postoperativ vårdtid

Uva 1-2 h

## Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs.

Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

## Granskare/arbetsgrupp

Linda Aledal, Avdelningslärare/Anestesisjuksköterska, Operation 7, Omr 5, An/Op/IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, Omr 5, An/Op/IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Operation 7 Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

**Granskad av:** Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-952

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2026-05-29

**Giltig till:** 2028-05-29