

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård

Giltig från: 2024-08-28

Sahlgrenska

Giltig till: 2026-08-28

Innehållsansvar: Till Rudolph, (tilru1), Överläkare

Granskad av: Till Rudolph, (tilru1), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Decubitus revision med eller utan lambåtäckning

Arbetsbeskrivning

Patient

Patient med decubitus/trycksår efter immobilitet. Ex paraplegiker, tetraplegiker.

Premed

Premed T. Alvedon 1000mg, T. Arcoxia 60 -120mg, Oxycontin 5 - 15mg,
Betapred 8mg, T. Ondansetron 8mg p.o.

Uppläggning

Uppläggning i samråd med operationspersonalen och kirurgen. Ofta i sidoläge
med kulmadrass eller bukläge med bukbord och proneview.

Temp

Kroppstemperatur 37 grader måste aktivt eftersträvas. Viktigt med att
monitorera kroppstemperaturen och aktivt värma patienten med Astopad,
Warmtouch och/ eller varma vätskor.

Vätskor

Ringer-Acetat i pump

Blod

Blodgruppering ja, vid större sårrevisioner ev. bastest.

Antibiotikaproylax

Enl. ord.

Anestesi

Generell anestesi alt. sedering mot ev. spastisitet ex. Midazolam.

Smärtlindring

Utrustning

PVK x 2, tänk på placering då pat ibland läggs i bukläge efter induktion.

Övrigt

Ev. går patienten direkt till vårdavdelningen om inte uttalad postoperativ blödningsrisk föreligger eller

sedativa kvarstår.

Op. Tid

mellan 1 - 2 timmar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Till Rudolph, (tilru1), Överläkare

Granskad av: Till Rudolph, (tilru1), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-976

Version: 4.0

Giltig från: 2024-08-28

Giltig till: 2026-08-28