

Gäller för: Verksamhet Beroende och akutpsykiatri
Innehållsansvar: Elin Lindedal, (elith21), Apotekare
Granskad av: Olle Hagberg, (ollha4), Överläkare
Godkänd av: Karina Stein, (karst15), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-08-18

Giltig till: 2028-08-05

Depotinjektioner antipsykotika, verksamhet Beroende och akutpsykiatri

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin

Bakgrund och syfte

Säkerställa tydlig hantering av ordination, rekvisition och dokumentation av antipsykotiska depotinjektioner i öppenvård. Optimera förutsättningar för patienters följsamhet till behandling, samt minskad läkemedelskostnad.

Förutsättningar

Ansvar

Läkare och sjuksköterskor ansvarar för att följa rutinen i tillämpliga delar för patienter de vårdar. Vårdenhetsöverläkare ansvarar för att rutinen följs på respektive enhet.

Utförande

Inom slutenvård

Ordination:

1. Depotinjektioner ordinerar enligt schema i läkemedelsmodul Melior (exempelvis var fjärde vecka eller var 28e dag).
2. Dokumentera senaste givna injektion samt datum för nästa planerade injektion i anvisningsruta i läkemedelsmodul.

Vid inskrivning:

3. Om läkemedlet sedan tidigare är ordinerat enligt PM i läkemedelsmodul kryssas denna ordination och ordinerar på nytt enligt schema.

Administrering av injektion:

4. Sjuksköterska administrerar injektion enligt ordination och signerar i läkemedelsmodul efter given injektion.

Vid utskrivning:

5. Vid nyinsatt depotbehandling lyfts information av läkare på behandlingskonferens ÖV/SV och/eller via vårdgrannnetelefon vid behov.
6. Nyinsatt depotbehandling ordinerar i öppenvårdens läkemedelsmodul så att sjuksköterska kan signera nästkommande injektion.
7. Datum för nästa injektion dokumenteras i vård- och läkemedelsberättelse i Melior under "planering" och förmedlas till patient vid utskrivning.

Inom öppenvård

Ordination:

1. Depotinjektion ordinerar enligt schema i läkemedelsmodul Melior (exempelvis var fjärde vecka eller var 28e dag).

Administrering av injektion:

2. Sjuksköterska administrerar injektion och signerar i läkemedelsmodul efter given injektion.
3. Dokumentera administrering även i journal (Melior).

Pilning av ordination:

4. Läkare pilar injektionsordination i läkemedelsmodulen vid varje patientbesök.
5. Om patient har långa intervall mellan besök, påminner sjuksköterska läkare om att pila ordination.

Förskrivning i Pascal:

6. För patient som erhåller injektion på öppenvårdsmottagning - förskriv depotinjektion med tydlig anvisning: *"Detta läkemedel sköts internt av mottagning och ingen expedition ska ske på apoteket."*

Relaterad information

[Zyphaderabehandling](#)

Uppföljning

Enhets-/vårdenhetschefer och sektionschefer ansvarar för uppföljning av rutinen.

Medvetna avsteg från rutinen dokumenteras i Melior, övriga avsteg rapporteras i MedControl PRO

Arbetsgrupp

Elin Lindedal, apotekare verksamhet beroende och akutpsykiatri/Vårdfarmaci

Saleh Buwaider, apotekare verksamhet beroende och akutpsykiatri/Vårdfarmaci

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Beroende och akutpsykiatri

Innehållsansvar: Elin Lindedal, (elith21), Apotekare

Granskad av: Olle Hagberg, (ollha4), Överläkare

Godkänd av: Karina Stein, (karst15), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9806-1988473940-497

Version: 1.0

Giltig från: 2026-08-18

Giltig till: 2028-08-05