OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård
Innehållsansvar: Christina Jansén, (chrja8), Överläkare
Granskad av: Wolf Wonneberger, (wolwo), Sektionschef
Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5), Överläkare/Professor
Giltig från: 2026-08-28
Giltig till: 2028-08-27

ÖGONJOUR Omhändertagande av patienter som exponerats för manettrådar

Syfte

Omhändertagande av patient som exponerats för manettrådar.

Bakgrund

Manettrådarna innehåller ett toxin som ger en toxisk reaktion från ögat eller huden. Även senarelagd överkänslighetsreaktion är beskriven.

Systemsymptom såsom svaghet, huvudvärk, kräkning, muskelkramp, feber, frysningar, andningssvårigheter, anafylaktisk chock har beskrivits.

Lokala ögonreaktioner är: hudutslag, kemos, toxisk konjunktivit, kornealsår, irit, tryckstegring, ackommodationssvårigheter och mydriasis. Prognosen är i de flesta fall god och behandlingen i huvudsak symptomatisk.

Arbetsbeskrivning

Akut behandling

- Spola med saltvatten eller fysiologiskt koksalt
- Avlägsna manettrådar (använd instrument eller handskar)

Kompletterande behandling

- Svaga kortisonpreparat ögondroppar

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

- Profylaktisk antibiotika om korneala epiteldefekter
- Behandla eventuell tryckstegring
- Smärtstillande; bedövningsdroppar, endast i akutskedet, (försiktighet att skicka med hem, max 2 pipetter) och tabletter
- Antihistamin tabletter mot klåda.
- Hydrokortison på huden

Ansvar

All vårdpersonal och linjechefer.

Författare av dokumentet

Madeleine Zetterberg, professor/ överläkare

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Christina Jansén, (chrja8), Överläkare

Granskad av: Wolf Wonneberger, (wolwo), Sektionschef

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5), Överläkare/Professor

Dokument-ID: SU9820-1156830909-135

Version: 10.0

Giltig från: 2026-08-28

Giltig till: 2028-08-27