

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Giltig från: 2024-09-14

Innehållsansvar: Christina Jansén, (chrja8), Överläkare

Giltig till: 2026-09-05

Granskad av: Wolf Wonneberger, (wolwo), Sektionschef

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5), Överläkare/Professor

ÖGONJOUR Omhändertagande av patienter som exponerats för manettrådar

Syfte

Omhändertagande av patient som exponerats för manettrådar.

Bakgrund

Manettrådarna innehåller ett toxin som ger en toxisk reaktion från ögat eller huden. Även senarelagd överkänslighetsreaktion är beskriven.

Systemsymptom såsom svaghet, huvudvärk, kräkning, muskelkramp, feber, frysningar, andningssvårigheter, anafylaktisk chock har beskrivits.

Lokala ögonreaktioner är: hudutslag, kemos, toxisk konjunktivit, kornealsår, irit, tryckstegring, ackommodationssvårigheter och mydriasis. Prognosen är i de flesta fall god och behandlingen i huvudsak symptomatisk.

Arbetsbeskrivning

Akut behandling

- Spola med saltvatten eller fysiologiskt koksalt
- Avlägsna manettrådar (använd instrument eller handskar)
- Kylförband (cold pack) kan vara god smärtstillande.

Kompletterande behandling

- Hydrokortison på huden
- Svagt kortisonpreparat i ögat
- Profylaktisk antibiotika i ögat om kornealskada
- Smärtstillande droppar/tabletter
- Antihistamin tabletter mot klåda.

Ansvar

All vårdpersonal och linjechefer.

Författare av dokumentet

Madeleine Zetterberg, professor/ överläkare

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Christina Jansén, (chrja8), Överläkare

Granskad av: Wolf Wonneberger, (wolwo), Sektionschef

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5), Överläkare/Professor

Dokument-ID: SU9820-1156830909-135

Version: 9.0

Giltig från: 2024-09-14

Giltig till: 2026-09-05