

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Giltig från: 2025-03-17

Innehållsansvar: Kalliopi Erripi, (kaler1), Överläkare

Giltig till: 2027-03-17

Granskad av: Anette Erlandsson, (aneer6), Vårdenhetschef

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5), Överläkare/Professor

ÖGONPLASTIK Blödning efter operation i näsan (tex tårvägsoperation)

Syfte

Patienter som är opererade i näsan har oftast blodblandad vätska från näsan postoperativt. Om blödning uppstår skall åtgärder vidtas för att minska blödning.

Arbetsbeskrivning

Åtgärd vid blödning

Steg 1: Sänkläge, lugn, höj huvudändan på sängen.

Steg 2: Undvik varma drycker. Ge isbitar att suga på. Kall dryck eller glass.

Steg 3: Näsförband appliceras för näsborrarna och knytes (finns på **näsblödningsbrickan** i medicinrummet på avd 205).

Steg 4: Om inga kontraindikationer hos patienten, ges efter läkarordination Cyklokapron 3 tablett = 1,5 g x 3. Kontraindikationer är om patienten tidigare haft trombos eller familjär tromboembolisk sjukdom.

Steg 5: Om fortsatt blödning kontakt med jourhavande öronläkare, Sahlgrenska sjukhuset.

Om ögonläkare med god kännedom om inläggande av nästamponad finns tillgänglig kan detta utföras vid behov.

Ansvar

Denna rutin gäller för alla medarbetare inom Ögonsjukvården, Område 3, SU.

Ansvar för spridning är Vårdenhetschef på avd 205, som också ansvarar för att en kopia av denna rutin finns på **näsblödningsbrickan**.

Öronläkare Erik Odelberg är konsulterad för vilka åtgärder som skall vidtas vid näsblödning på patient som vårdas på avd 205.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Kalliopi Erripi, (kaler1), Överläkare

Granskad av: Anette Erlandsson, (aneer6), Vårdenhetschef

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5),
Överläkare/Professor

Dokument-ID: SU9820-1156830909-149

Version: 12.0

Giltig från: 2025-03-17

Giltig till: 2027-03-17