

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Giltig från: 2026-05-29

Innehållsansvar: Maria Mas Castells, (marma292), Överläkare

Giltig till: 2028-05-20

Granskad av: Wolf Wonneberger, (wolwo), Sektionschef

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5), Överläkare/Professor

ÖGPNPLASTIK, OPERATION 2 och Avd 205 Mohs kirurgi

Syfte

Kvalitetssäkra vården vid Mohs kirurgi.

Arbetsbeskrivning

Operation

Mohs kirurgi är en kirurgisk metod där man avlägsnar hudcancer. Tumörpreparatet analyseras i mikroskop för att säkerställa att alla tumörceller tagits bort. Analysen görs av personal från patologiska laboratoriet Sahlgrenska Universitetssjukhuset som kommer till operationsavdelningen. Om det finns tumörceller kvar efter excisionen måste en ny excision göras och analyseras på samma sätt. Patienten får under tiden åka tillbaka till avdelningen och invänta svar som meddelas till operationsavdelningen. Patienten kommer tillbaka till operation för kompletterande excision eller om provet är radikalt avslutas med en rekonstruerande operation. På samma dag kan flera patienter med denna diagnos opereras.

Material på operationssal

Uppdukning av sterilt material sker på operationssalen. Ett nytt operationsbord dukas för varje excision som görs. Om operationen är radikal dukas ett nytt operationsbord och operationsområdet rekonstrueras och förband läggs enligt ordination.

Patient

Patient hämtas från avd 205 av avdelningspersonal som kör ner patienten till preoperativa enheten. Patienten transporteras med rullstol till operationsavdelningen.

Mellan operationerna lämnas såret öppet och täcks med mjukt fuktigt förband, kompresser och salva enligt ordination.

Vid nästkommande operation tvättas såret med Klorhexidinlösning 0,5 mg/ml. Huden runt såret tvättas med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. EJ sprit på sårkanterna.

Ansvar

Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOSFS 2011: 9.

Vårdenhetschefen ansvarar för att rutinen är känd och att den följs på enheten.

Rutinansvarig läkare ansvarar för uppdatering av innehållet i rutinen.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Maria Mas Castells, (marma292), Överläkare

Granskad av: Wolf Wonneberger, (wolwo), Sektionschef

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5),
Överläkare/Professor

Dokument-ID: SU9820-1156830909-158

Version: 8.0

Giltig från: 2026-05-29

Giltig till: 2028-05-20