

BARNÖGON Bedömning av remisser samt egen vårdbegäran

Syfte

Beslutstöd vid bedömning av remisser till Ögonmottagning barn Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

Remissorsak

Skelning

- Plötslig skelning alla åldrar, till läkare **<2 veckor**.
- Misstänkt skelning eller skelning som funnits
veckor/månader:
 - ålder 0 – cirka 3 år, till läkare **<1 månad**.
 - ålder > 3 år, till ortoptist **<1 månad** (+fundus foto till läkarbedömning).

Lågt visus

- Visus **<0,5**: till sjuksköterska/optiker på ögonklinik **<1 månad**. (+fundus foto till läkarbedömning).
- Visus \geq **0,5**: till sjuksköterska/optiker på ögonklinik **<3 månader**. (+fundus foto till läkarbedömning).
- Svårighet att visuspröva: till sjuksköterska/optiker **<3 månader**.

Svårbedömd röd reflex

Till läkare **<2 veckor**.

Avsaknad av röd reflex: retinoblastom- eller kataraktmisstanke

Till läkare akut: **<5 dagar.**

Ring 347 20, ssk exp Östra Barnögonmottagning för att boka in barnet till barnoftalmolog eller jouren.

Huvudvärksutredning -papillödem

- Om alarmerande symtom samt huvudvärk: till läkare akut **<några få dagar.**
- Viss/låg misstanke om förhöjt intrakraniellt tryck: till läkare **<2 veckor.**
- För bedömning av synrelaterad huvudvärk/astenopa besvär: till läkare alt ortoptist/sköterska/optiker **<1 månad.**

Juvenil idiopatisk artrit

Till läkare **<2 veckor.**

Diplopi

- Akut diplopi: till läkare akut **<några få dagar.**
- Om ej alarmerande bild (långvarig, intermittent diplopi m.m): till läkare/ortoptist inom **<1 månad.**

Neonatal konjunktivit

Till läkare akut **samma dag.**

Dacrocystit

Till läkare akut: barn oftalmolog eller jouren **samma dag.**

Naevus flammeus

Till läkare **<2 veckor.**

Nystagmus

- Akut nyttillkommen nystagmus: till läkare akut **<några få dagar.**
- Övriga nystagmus: till läkare **<2 veckor.**

Anisokori

Till läkare **<2 veckor**.

Vagel/chalazion

- Lättare besvär, kortvarig duration eller oklar diagnos.
Returnera remissen och begär eventuellt kompletterande foto.
I Sälma: ”Åter till inremitterande”, diktera brev till inremitterande.
- Stora, besvärliga vaglar, blefarit misstanke eller andra symtom ev. till läkare för bedömning akut eller subakut **<2 veckor**.

Tårvägsstenos

”Vidarebefordras” till privat vårdgivare.

I Sälma: Välj grupp ”Ögon barn koord Östra”. Skriv i gula rutan ”Hänvisa till Lundby”.

Dyslexiutredning

Ortoptist **<3 månader**. (+fundus foto till läkarbedömning).

Färgsinnesbedömningar

På ögonklinik utförs inte färgsinnesbedömningar hos barn om det inte föreligger andra tecken på ögonsjukdom såsom nedsatt visus, dåligt mörkerseende eller uttalad ljuskänslighet. Övriga symtom avgör prioritering.

Önskar patient eller föräldrar färgsinnesundersökning hänvisas patienten till optiker, privat vårdgivare eller yrkesskola.

Hörselnedsättning

I okomplicerade fall utan synsymtom: till läkare **<3 månader**.

Thalassemi

I okomplicerade fall utan synsymtom till läkare inom <3 månader

För att få foton skickade till Ögonmottagningen barn SU, kontakta 1177.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård, Drottning Silvias barnsjukhus

Innehållsansvar: Pia Lundgren, (pialu6), Överläkare

Granskad av: Gunilla Magnusson, (gunma40), Överläkare,
Mariya Petrishka-Lozenska, (marpe242), Överläkare

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5),
Överläkare/Professor

Dokument-ID: SU9820-1156830909-238

Version: 1.0

Giltig från: 2024-12-09

Giltig till: 2026-12-09