

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  
Operation 2 Mölndal, Mölndals sjukhus  
Innehållsansvar: Gunnar Jakobsson, (gunja12), Överläkare  
Granskad av: Maryam Cyrus, (marcy), Vårdenhetschef  
Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5), Överläkare/Professor

Giltig från: 2025-09-02

Giltig till: 2027-08-22

# **OPERATION 2 och Intraokulära operationer**

## **Antibiotikaproylax Vigamox 1 mg/ml**

### **Syfte**

Att säkerställa rutin vid införandet av annat läkemedel för antibiotikaproylax vid intraokulära operationer.

### **Arbetsbeskrivning**

Läkemedlet blandas enligt rutin av sjuksköterska som signerar på avsedd etikett, som fästes på flaskan.

Läkemedlet är hållbart max 5 timmar efter blandning i rumstemperatur. I kylskåp är hållbarheten 24 timmar. Gäller både blandad lösning samt öppnad Vigamoxflaska.

Varje sjuksköterska blandar sin egen Vigamox till sin operationssal. Läkemedlet är därmed salsbundet.

**VID UPPDRAGNING AV LÄKEMEDLET, TAS ALLTID EN NY SPRUTA, 1 ML, SOM GES AV UNDERSKÖTERSKA PÅ SAL.  
Sprita av membran.**

## **Spädningsinstruktion Vigamox 1 mg/ml**

1 st Vigamox ögondroppar 5 mg/ml

1 st Natriumklorid 9 mg/ml (glasflaska) 50 ml

Minispika med filter

60 ml spruta

3 ml spruta

Rosa/blå uppdragningskanyl

- Dra upp 42 ml Natriumklorid i 60 ml sprutan, kassera. Flaskan har nu 8 ml Natriumklorid.
- Dra upp 2 ml Vigamox i 3 ml sprutan, blanda ner i flaskan med 8 ml Natriumklorid.
- Flaskan innehåller nu 10 ml av blandningen Vigamox 1 mg /ml.
- Märk flaskan med 1 mg/ml, datum, klockslag samt signatur.
- Märk eventuell överbliven Vigamox (flaskan) med datum, klockslag samt signatur.

Båda förvaras i kylskåpet och är hållbara i 24 timmar.

Blandad lösning håller 5 timmar i rumstemperatur.

## **Dosering**

Standarddos: Dra upp 0,2 ml (= 0,2 mg). Dosen ges intrakameralt.

## **Ansvar**

Vårdenhetschef ansvarar för att arbeta efter denna rutin och för att denna rutin blir känd och för att den finns. Sektionsledare ansvarar för uppföljning /revision av innehållet i rutinen.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Ögonsjukvård, Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset, Operation 2 Mölndal, Mölndals sjukhus

**Innehållsansvar:** Gunnar Jakobsson, (gunja12), Överläkare

**Granskad av:** Maryam Cyrus, (marcy), Vårdenhetschef

**Godkänd av:** Madeleine Zetterberg, (madan5),  
Överläkare/Professor

**Dokument-ID:** SU9820-1156830909-245

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2025-09-02

**Giltig till:** 2027-08-22