

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Giltig från: 2026-01-30

Innehållsansvar: Angel Sanchez Sanz, (angsa8), Överläkare

Giltig till: 2028-01-30

Granskad av: Helena Lavitskij Söderling, (heler28), Specialistläkare

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5), Överläkare/Professor

# OPERATION 2

## Bupivacain 5 mg/ml

### Syfte

Att vid retrobulbär- samt flushbedövning använda en rutin som säkerställer att smittspridning mellan patienter förhindras.

### Arbetsbeskrivning

- Läkemedlet (**flaska Bupivacain 5 mg/ml**) är salsbundet.
- Läkemedelsbehållaren märks med datum och signatur.
- Läkemedlet kan användas till flera patienter på samma sal under en och samma dag.
- VID UPPDRAGNING AV LÄKEMEDLET, TAS ALLTID EN NY SPRUTA, SOM GES AV UNDERSKÖTERSKA PÅ SAL.
- Läkemedlet kasseras vid dagens slut.

### Ansvar

Rutinen gäller för operationssjuksköterskorna på Operation 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ansvarig för spridning av rutinen är Vårdenhetschefen på Operation 2.

Ansvarig för rutinen är Ögonsjukvårdens läkemedelsansvariga

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

sköterskor (Stina Nyström och Sofia Robert) samt läkemedelsansvarig läkare (Àngel Sánchez Sanz).

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient.” Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Ögonsjukvård

**Innehållsansvar:** Angel Sanchez Sanz, (angsa8), Överläkare

**Granskad av:** Helena Lavitskij Söderling, (heler28),  
Specialistläkare

**Godkänd av:** Madeleine Zetterberg, (madan5),  
Överläkare/Professor

**Dokument-ID:** SU9820-1156830909-250

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2026-01-30

**Giltig till:** 2028-01-30