

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Giltig från: 2025-12-02

Innehållsansvar: Anette Erlandsson, (aneer6), Vårdenhetschef

Giltig till: 2027-11-20

Granskad av: Wolf Wonneberger, (wolwo), Sektionschef

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5), Överläkare/Professor

AVD 205 Omhändertagande av diabetes patienter

Syfte

Det är av stor vikt att patienter ligger stabilt i sitt blodsocker. I samband med sjukdom och sjukhusvistelse förändras patientens vardagssituation och detta leder till ökad risk för höjning i blodsockernivåer. Genom regelbundna kontroller på vårdavdelningen kan man hjälpa patienter att upptäcka höjningar i blodsocker och reglera till för patienten normala nivåer.

Arbetsbeskrivning

Inskrivningsfrågor utöver de vanliga rutinfrågorna:

Insulin administrering - sprutor? pennor? Pump?

Blodsockerbalans

Hur ofta kontrolleras blodsockret hemma?

Insulinkänningar - dagtid, nattetid?

Andra komplikationer - njurar, känsel, hud – sår?

P-glucos-kontroller på insulinbehandlade diabetiker:

Intagningsdagen: Inkomstprov innan kl. 16:00 eventuellt kl. 22:00.

Operationsdagen: P- glucos

Före måltid kl. 11:30, 16:00 19:00 samt kl. 22:00.

Andra tider vid behov till exempel preop innan patienten körs till operation samt efter utförd operation.

Dagen efter operation: P-glucos

Därefter samma tider som ovan vid behov.

Patienter som är opererade i lokalbedövning och mår bra, behöver inte rutinmässigt kontrolleras lika ofta, men följa samma tider enligt ovan vid behov.

OBS! Viktigt att patienten i möjligaste mån följer sina egna ordinarie insulin och blodsocker rutiner.

Också viktigt att patienter kommer igång med ordinarie doser insulin postoperativt.

Tablettbehandlade diabetiker

P-glukos som inkomstprov och P-glucos operationsdagen räcker, samt fler vid behov.

Om patienten ej tagit sin morgonmedicin bör den tas postoperativt.

Ansvar

Gäller för personal på avd 205/område3/SU. Ansvar för spridning och implementering har VEC/VC. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Dokumentation

P-glukos värden dokumenteras i patientdatasystemet Melior.

Viktigt att dokumentera patientens egna åtgärder, för att kunna ta ställning till eventuella åtgärder vid högt/lågt P-glukos eller annan komplikation.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Anette Erlandsson, (aneer6), Vårdenhetschef

Granskad av: Wolf Wonneberger, (wolwo), Sektionschef

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5),
Överläkare/Professor

Dokument-ID: SU9820-1156830909-42

Version: 8.0

Giltig från: 2025-12-02

Giltig till: 2027-11-20