

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Giltig från: 2026-08-28

Innehållsansvar: Anette Erlandsson, (aneer6), Vårdenhetschef

Giltig till: 2028-08-27

Granskad av: Cecilia Gustavsson, (cecgu6), Sjuksköterska

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5), Överläkare/Professor

AVD 205 Rutin avseende p-glukos hos patienter med insulinbehandlad diabetes mellitus

Syfte

Det är av stor vikt att patienter med diabetes ligger stabilt i sitt blodsocker. I samband med sjukdom och/eller sjukhusvistelse förändrar patientens vardagssituation och detta leder till en ökad risk för höjningar i blodsockernivåer. Genom regelbundna kontroller på vårdavdelningen kan man hjälpa patienten att upptäcka höjningar i blodsockret och reglera till för patienten normala nivåer.

Arbetsbeskrivning

- P-glukos skall tas före måltid på ALLA patienter med insulinbehandlad diabetes.
- Om P-glukos över 13 mmol/l lägg till snabbinsulin (viktberoende)
- Om över 13 mmol/l ge 4 E NovoRapid (alt. Humalog)
- 20 mmol/l ge 6 E ” ”
- 24 mmol/l ge 8 E ” ”
- Ordinerar av läkare och ges i samråd med patienten, oftast strax före måltid.
- Nytt P-glukos tas efter 1–2 timmar.

OBS!!! Ackumulerad effekt om injektionen upprepas - se: www.FASS.se

Viktigt att ej ge extra insulin för sent på kvällen.

Ansvar

Gäller för sjuksköterskor på Avd 205/Område 3/SU. Ansvar för spridning och implementering har VEC/EC. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patienten. Rutinen skall revideras årligen av innehålls ansvarig.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Anette Erlandsson, (aneer6), Vårdenhetschef

Granskad av: Cecilia Gustavsson, (cecgu6), Sjuksköterska

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5),
Överläkare/Professor

Dokument-ID: SU9820-1156830909-45

Version: 8.0

Giltig från: 2026-08-28

Giltig till: 2028-08-27