

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Giltig från: 2026-02-02

Innehållsansvar: Yuri Belitsky, (yurbe1), Underläkare, ST

Giltig till: 2028-02-02

Granskad av: Stefan Wallgren, (stewa7), Optiker

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5), Överläkare/Professor

GLAUKOM Uppföljning med synfältsserie av patient med nyupptäckt tidigt moderat öppenvinkelglaukom

Syfte

Rutinen syftar till att optimera befintliga resurser och ge riktlinjer för rimlig prioritering och patienthandläggning avseende patienter med relativ nyupptäckt öppenvinkel glaukom med tidiga – moderata glaukomatösa skador med stabiliserat ögontryck.

Arbetsbeskrivning

1. En separat planeringslista för synfälts-serie (SF-S) skapas i Elvis.
2. Patienter som uppfyller kriterier för SF-S kontroll ska informeras vid senaste besök alternativt brevledes (brev som skickas till patienten efter läkarbedömning) eller telefonledes.
3. Följande patienter inkluderas i SF-S:
 - **Stabilt** status är fastställt av läkare, som skall initiera att SF-S startas (infaller sannolikt cirka 3–6 månader efter debut).
 - Patienten är 75 år eller yngre. MD \leq - 12 dB.
4. Undersökningsrutiner:
 - Synfält tas var 4:e månad under 2 års tid. Efter denna tid överlämnas resultat till glaukomläkare för fortsatt planering.
 - Rutin fortgår och sköts av sjuksköterska/optiker/undersköterska på glaukomteam.

5. Resultat överlämnas till glaukumläkare:

- 2 år efter första SF-S för ny planering.
- **Om** MD sjunkit 1.5 dB eller mer från baseline.
- **Om** ögontrycket ökar 5 mmHg eller mer från **måltryck** ordinerat av ögonläkare.
- **Om** medverkan vid synfältsundersökning är ej adekvat.

Ansvar

Samtliga läkare i Glaukomteam/Ögonsjukvården. Nytt beslut och godkännande skall ske då revision och uppdatering görs. Kännedom om rutiner sprids av verksamhetschef/sektionschef och processansvarig för glaukom och enhetschef administrativ personal.

Processansvarig för glaukom ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO. Rutinen revideras vid ändring av funktioner i läkemedelsmodulen i Melior och vid behov.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Yuri Belitsky, (yurbe1), Underläkare, ST

Granskad av: Stefan Wallgren, (stewa7), Optiker

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5),
Överläkare/Professor

Dokument-ID: SU9820-1156830909-87

Version: 8.0

Giltig från: 2026-02-02

Giltig till: 2028-02-02