

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Giltig från: 2024-11-13

Innehållsansvar: Anna Wahlberg, (annwa18), Överläkare

Giltig till: 2026-11-13

Granskad av: Wolf Wonneberger, (wolwo), Sektionschef

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5), Överläkare/Professor

KATARAKT Förundersökning inför läkarbesök respektive sjuksköterske- besök efter kataraktoperation

Syfte

Rutinen beskriver arbetsmomenten inför läkarbesök av patienter som genomgått kataraktoperation samt inför YAG laserbehandling.

Arbetsbeskrivning

Återbesök 1a dagen efter kataraktoperation

- Undersökning på aktuellt öga.
- Tryckmätning. Om tryck >25 mmHg (om inte operatören angett något annat) ska operatören kontaktas i första hand, annars en annan kataraktkirurg. (Gäller vid sköterskebesök).
- Visus okorrigerat.
- Visus med STPH.

Återbesök 1–3 veckor efter kataraktoperation

- Ordinerar av operatören i operationsberättelsen.
- Om operatören inte angivit något som vid återbesök efter 4–6 veckor.

Återbesök 4–6 veckor efter kataraktoperation

- Undersökning på aktuellt öga, eventuellt båda om ingen efterkontroll gjorts på det först opererade ögat.
- Autorefraktor.
- Visus okorrigerat.

- Visus med bästa korrektion.
- Tryckmätning. Applanatorisk tryckmätning vid glaukom, glaukommisstanke eller förhöjt tryck innan operation för övriga räcker det med I-Care.
- Dilatera båda ögonen med K-droppar.
- OCT makula (kan tas odilaterat) ska tas hos alla diabetiker, patienter med AMD, om synen inte förbättrats efter operation samt om postoperativa synen <0,8.

Förundersökning inför läkarbesök på YAG mottagning

- Undersök båda ögonen.
- Läs av glasögonen.
- Autorefraktor.
- Visus med bästa glas, båda ögonen. Eget glas om de är aktuella och stämmer med autorefraktorn annars refraktionera till bästa glas uppnås.
- Tryckmätning, båda ögonen. Applanatorisk tryckmätning vid glaukom, glaukommisstanke eller förhöjt tryck, för övriga räcker det med I-Care.
- Dilatera enbart det aktuella ögat med K-droppe om ej annat står i Elvis eller Melior.

OBS! Ingen dilatation på patient som ska göra en iridotomi.

Eventuellt ska droppar Pilocarpin ges till patienten. Fråga läkaren.

Ansvar

Undersköterska /ögonsjuksköterska som förundersöker ansvarar för att rutinen följs.

Processansvarig överläkare är ansvarig för att rutinen är känd och att all medicinsk personal har kunskap att följa rutinen på ett korrekt sätt.

Medarbetarna har ansvar att följa rutinen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Anna Wahlberg, (annwa18), Överläkare

Granskad av: Wolf Wonneberger, (wolwo), Sektionschef

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5), Överläkare/Professor

Dokument-ID: SU9820-1156830909-94

Version: 8.0

Giltig från: 2024-11-13

Giltig till: 2026-11-13