

# Nebido injektionsbehandling, Medicinmottagning Mölndal

Förändringar sedan föregående version  
Nytt dokument.

## Bakgrund och syfte

Beskrivning av arbetsflödet för att ge nebidoinjektion till patienter på Medicinmottagning Mölndal. Syftet är att skapa en gemensam och strukturerad rutin på mottagningen för att effektivisera och säkerhetsställa patientens vård och omhändertagande på ett optimalt sätt. På så sätt även minska risken för fel och brister samt underlätta introduktionen av en ny medarbetare.

Denna rutin är ett komplement till styrdokument [Behandling med Nebido](#) för verksamhet Specialistmedicin.

## Förutsättningar

Nebido är ett läkemedel för testosteronsubstitution. Intervall för Nebido ordinerar av ansvarig läkare. Vanligt intervall är 10-14 veckor. Läkaren ordinerar läkemedlet i Melior i aktuella ordinationer.

## Arbetsbeskrivning

Vid ordination av prover tas dessa före injektionen. I ELVIS står vilka prover som skall tas, vanliga prover är Hb, EVF, S-testosteron.

Patienten behöver inte ta prover fastande.

Vid EVF >0,54 kan patienten behöva göra en venesectio, kontakta PAL för diskussion.

Patienten har läkemedlet med sig, dra upp i 5-ml spruta. Obs! Är mycket trögflytande.

Nebido ges som mycket långsam intramuskulär injektion (minst två min) djupt i sätesmuskeln.

## Biverkningar

”Mikroemboli i lunga efter administrering av oljelösningar kan i sällsynta fall leda till symtom som hosta, dyspné, illamående, kraftig svettning, bröstsmärtor, yrsel, parestesier eller svimning. Dessa reaktioner kan uppträda under eller omedelbart efter injektion och är reversibla. Patienten bör därför övervakas under och omedelbart efter varje injektion för att man tidigt ska kunna se möjliga tecken och symtom på mikroemboli i lunga orsakad av olja. Behandlingen är vanligtvis symtomatisk, till exempel genom administrering av syrgas.”  
Enligt Fass.se.

## Efter injektion

Sjuksköterskan sätter diagnos + åtgärdskod i ELVIS och Melior samt dokumenterar en omvårdnadssanteckning i Melior, dokumentera även injektions lokalisation. Signera läkemedel i läkemedelsmodulen.

Gör nytt underlag i ELVIS, men boka ej ny tid direkt, eftersom dosintervall kan komma att ändras beroende på provsvar från dagens besök.

## Ansvar

Gäller på Medicinmottagning Mölndal, område 3, Sahlgrenska. Ansvar för spridning och implementering har verksamhetschef/enhetschef. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

## Arbetsgrupp

Josefin Romskaug, sjuksköterska/sektionsledare, Medicinmottagning  
Mölndal.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Medicin geriatrik och akutsjukvård  
Möln dal

**Innehållsansvar:** Josefin Romskaug, (josro11), Sektionsledare

**Granskad av:** Maria Roupe, (marlo43), Överläkare

**Godkänd av:** Pär Parén, (parpa1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9881-362022085-41

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2025-06-09

**Giltig till:** 2027-06-09