

Gäller för: Verksamhet Specialistmedicin

Innehållsansvar: Gisela Ringström, (gisri), Vårdenhetschef

Granskad av: Per Hedenström, (perhe14), Sektionschef

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-05-27

Giltig till: 2027-05-26

Antibiotikaprofylax vid PEG 104

Revideringar i denna version

Uppdaterade referenser.

Syfte

Att förebygga komplikationer vid PEG.

Arbetsbeskrivning

Utförande:

I direkt anslutning till avslutad PEG insättning ges Mixtur Bactrim (40 mg/ml + 8 mg/ml) 20 ml via PEG.

Vid behandling av bredspektrumantibiotika behövs ingen ytterligare antibiotikaprofylax.

Vid överkänslighet mot trimsulfa kontakta GEA

Ansvar

Läkare och sjuksköterskor på GEA.

Uppföljning, utvärdering och revision

Vårdenhetschef och sektionschef ansvarar för regelbunden uppföljning och utvärdering av verksamhetens styrande dokument.

Revideringsansvarig är innehållsansvarig eller dennes av Sektionschef utsedd ersättare.

Medvetet avsteg dokumenteras i Melior om det är kopplat till patient.

Övriga orsaker till avsteg rapporteras i MedControl PRO.

Kunskapsöversikt

SGF Nationella Riktlinjer:

Handläggning av perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) och andra perkutana nutritionssonder, 2023

Antibiotikaproylax inför gastrointestinal endoskopi, 2023

Granskare/arbetsgrupp

Per Hedenström sektionschef

Jessica Ryhlander Sjuksköterska GEA

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Specialistmedicin

Innehållsansvar: Gisela Ringström, (gisri), Vårdenhetschef

Granskad av: Per Hedenström, (perhe14), Sektionschef

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9882-597462984-22

Version: 7.0

Giltig från: 2025-05-27

Giltig till: 2027-05-26