

Gäller för: Gastroenterologisk endoskopimottagning Sahlgrenska

Giltig från: 2025-05-27

Innehållsansvar: Gisela Ringström, (gisri), Vårdenhetschef

Giltig till: 2027-05-26

Granskad av: Per Hedenström, (perhe14), Sektionschef

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

Dubbelballongendoskopi-nerifrån

Patientinformation 120

Revideringar i denna version

Inga ändringar gjorda.

Syfte

Patientinformation för ineliggande patienter som ska göra dubbelballong

Vad är Dubbelballongundersökning?

Detta är en undersökning av hela eller större delen av tunntarmen via ändtarmen. Vid undersökningen används ett endoskop. Det är ett instrument som består av en böjlig slang som är ungefär 1,5 meter lång samt knappt en centimeter i diameter. Längst fram finns en liten videokamera som överför bilder av slemhinnan till en TV-skärm. Med två ballonger som monteras på instrumentet kan man dra sig fram igenom tunntarmen och komma mycket längre än vid vanlig koloskopi. I samband med undersökningen kan det även tas prover, blödningar stoppas och polyper tas bort.

Förberedelser:

Innan du blir undersökt med dubbelballonginstrument måste tarmen tömmas på innehåll genom att du dricker en laxeringsvätska. Tarmsköljning påbörjas alltid dagen före undersökning.

OBS! Du som medicinerar med:

- Någon blodförtunnande medicin, prata med sjuksköterskan på avdelningen.

- Andra mediciner kan du ta som vanligt på undersökningdagen dock minst 2 timmar före undersökning.

Hur går undersökningen till?

Under undersökningen får du ligga på vänster sida på en undersökningsbänk. Vid undersökning via ändtarmen är det samma tillvägagångsätt som vid en koloskopi. Det som skiljer är dels längden på instrumentet samt ballongerna som växelvis töms och fylls för att komma fram igenom tarmen. Undersökningen tar olika tid i anspråk, genomsnittstiden är 75 minuter. Vi ger lugnande och smärtstillande läkemedel vid undersökningen och tillför allteftersom mer om du behöver det.

Det är **EJ** tillåtet att köra bil under resten av dagen efter denna medicinering.

Efter undersökningen

Efter undersökningen kan du äta och dricka som vanligt.

Magen kan upplevas spänd och uppblåst efter undersökningen, du kan även känna av knip. Det beror på den gas som blåstes in vid undersökningen, obehagen lättar allteftersom gasen kommer ut. Medicineringen gör att du kan känna dig trött resten av dagen.

Efter undersökning ges muntligt och skriftligt besked om vad som är utfört.

Granskare/arbetsgrupp

Per Hedenström Sektionschef Gastroenterologi och hepatologi/Medicin/område 6,

Andreas Pischel ÖL GEA,

Gisela Ringström VEC GEA

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Gastroenterologisk endoskopimottagning
Sahlgrenska

Innehållsansvar: Gisela Ringström, (gisri), Vårdenhetschef

Granskad av: Per Hedenström, (perhe14), Sektionschef

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9882-597462984-28

Version: 5.0

Giltig från: 2025-05-27

Giltig till: 2027-05-26