

Gäller för: Gastroenterologisk endoskopimottagning Sahlgrenska

Giltig från: 2025-05-27

Innehållsansvar: Gisela Ringström, (gisri), Vårdenhetschef

Giltig till: 2027-05-26

Granskad av: Per Hedenström, (perhe14), Sektionschef

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

Dubbelballongendoskopi-uppifrån

Patientinformation 121

Revideringar i denna version

Inga ändringar

Syfte

Patientinformation för inneliggande patienter som ska göra dubbelballongendoskopi

Vad är Dubbelballongundersökning?

Detta är en undersökning av hela eller större delen av tunntarmen via munnen. Vid undersökningen används ett endoskop. Det är ett instrument som består av en böjlig slang som är ungefär 1,5 meter lång samt knappt en centimeter i diameter. Längst fram finns en liten videokamera som överför bilder av slemhinnan till en TV-skärm. Med två ballonger som monteras på instrumentet kan man dra sig fram igenom tunntarmen och komma mycket längre än vid vanlig gastroskopi. I samband med undersökningen kan det även tas prover, blödningar stoppas och polyper tas bort.

Vilka förberedelser krävs?

Innan du blir undersökt med dubbelballonginstrument måste magsäcken och tunntarmen tömmas på innehåll genom att du dricker en laxeringsvätska. Tarmskölningsvätskan gör så att magen sätts igång och du får diarré.

Det är viktigt att du inte dricker något 2 timmar före undersökning, detta för att magsäcken ska vara tömd.

Tarmsköljning

1 dos Movprep/Laxabon/Picoprep kl.18:00 kvällen före undersökning, därefter klar dryck fram tills 2 timmar före undersökningsstart.

OBS! Du som medicinerar med:

- Någon blodförtunnande medicin, prata med sjuksköterskan på avdelningen.
- Andra mediciner kan du ta som vanligt på undersökningdagen dock minst 2 timmar före undersökning.

Hur går undersökningen till?

Under undersökningen får du ligga på vänster sida på en undersökningsbreds. Undersökning via munnen är samma tillvägagångssätt som vid en gastroskopi. Det som skiljer är dels längden på instrumentet samt ballongerna som växelvis töms och fylls för att komma fram igenom tunntarmen. Undersökningen tar olika tid i anspråk, genomsnittstiden är 75 minuter. Vi ger lugnande och smärtstillande läkemedel vid undersökningen och tillför allteftersom mer om du behöver det.

Det är **EJ** tillåtet att köra bil under resten av dagen efter denna medicinering.

Efter undersökningen

En timma efter undersökning går det bra att äta och dricka.

Magen kan upplevas spänd och uppblåst efter undersökningen, du kan även känna av knip. Det beror på den gas som blåstes in vid undersökningen, obehagen lättar allteftersom gasen kommer ut. Medicineringen gör att du kan känna dig trött resten av dagen. Efter undersökning ges muntligt och skriftligt besked om vad som är utfört.

Granskare/arbetsgrupp

Per Hedenström Sektionschef Gastroenterologi och hepatologi/Medicin/område 6, Andreas Pischel ÖL GEA, Gisela Ringström VEC GEA

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Gastroenterologisk endoskopimottagning
Sahlgrenska

Innehållsansvar: Gisela Ringström, (gisri), Vårdenhetschef

Granskad av: Per Hedenström, (perhe14), Sektionschef

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9882-597462984-29

Version: 5.0

Giltig från: 2025-05-27

Giltig till: 2027-05-26