

Gäller för: Verksamhet Specialistmedicin

Giltig från: 2025-06-13

Innehållsansvar: Gisela Ringström, (gisri), Vårdenhetschef

Giltig till: 2027-06-05

Granskad av: Svein Olav Bratlie, (svebr1), Sektionschef

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

Dubbelballongenteroskopi (DBE) – information till personal 106

Revideringar i denna version

Inga ändringar

Syfte

Att tydliggöra rutin inför och efter undersökning för slutenvårdspatienter som genomgår dubbelballongenteroskopi.

Arbetsbeskrivning

Laxabon® är förstahands preparat för slutenvårdspatienter och särskilt för patienter med aktiv pågående nedre GI-blödning. Hos patienter med grav njur- och hjärtsvikt bör Laxabon® användas.

Järntabletter ska sättas ut 5 dagar före undersökning, intravenös järnsubstitution kan fortgå som vanligt.

Dubbelballong uppifrån (via munnen)

- Tarmförberedelse som vid koloskopi fast med halverad dos Laxabon® (2liter), Movprep®(1liter) eller Picoprep®(1dos). V.g. se ”Rutin tarmförberedelser inför koloskopi ” för ytterligare instruktion.
- Fiberfattig kost kan intas dagen före undersökning fram tills tarmrengöringsstart. Efter denna får patienten enbart dricka klara drycker.
- Ge 2 liter Laxabon® från kl. 18:00 kvällen före undersökning alt motsvarande dos av Movprep® eller Picoprep®. Därefter får patienten endast dricka klara drycker.
- Undersökningdagen endast vatten fram till 2 h före undersökning.

- Fungerande venös infart skall finnas.
- Nytaget PK-värde vid antikoagulation med Warfarin eller vid känd sjukdom som skulle kunna påverka INR ex. leversjukdom.
- Vid INR >1,5 kontakta GEA för rådgivning.
- Vid behandling med antikoagulations/trombocyttaggregationshämmare hänvisar vi till rutin ”Utsättning av antikoagulantia och trombocythämmare inför endoskopi”.
- Piercing i läppar/munhåla ska tas bort.
- Märkt säng.
- Sanitetsskydd rekommenderas.
- Ifylld checklista inför endoskopi på GEA.

Dubbelballong nerifrån (via rektum)

- Om patienten äter järntabletter ska dessa sättas ut minst 5 dagar innan undersökning.
- Ge 2 T.Dulcolax® 1–2 dagar före undersökning, förslagsvis på kvällen 2 dagar före undersökning. T.Dulcolax® ger effekt efter ca 10h och om detta ges på kvällen stör den ej patientens nattsömn. Annars ges tableterna på morgonen dagen före undersökning.
- Fiberfattig kost kan intas dagen före undersökning fram tills tarmrengöringsstart. Efter denna får patienten enbart dricka klara drycker.
- Tarmförberedelse med 6l Laxabon® alt 3l Movprep® eller 3st doser Picoprep®. Preparaten ska delas upp på 2 doser. V.g. se ”Rutin Tarmförberedelser inför koloskopi” för utförligare instruktion. Tarmförberedelsen ska avslutas 2h före undersökning.
- Undersökningsdagen endast klara drycker.
- Venös infart.
- Nytaget PK-värde vid antikoagulation med Warfarin eller vid känd sjukdom som skulle kunna påverka INR ex. leversjukdom.
- Vid INR >1,5 kontakta GEA för rådgivning.
- Vid behandling med antikoagulations/trombocyttaggregationshämmare hänvisar vi till rutin ”Utsättning av antikoagulantia och trombocythämmare inför endoskopi”.
- Märkt säng.
- Sanitetsskydd rekommenderas.
- Ifylld checklista inför endoskopi på GEA.

Efter undersökningen

Patienten kan uppleva magen spänd och uppblåst samt även känna knip pga. den luft som insufflerats under undersökningen. Om denna ej avgår spontant kan patienten ev. bli hjälpt av en pip.

Vid ex. polypektomi och dilatationer finns alltid en risk för skada på tarmen. Vid kraftigt insättande smärta och försämrat allmäntillstånd efter undersökning bör detta tas i beaktande.

Ansvar

Läkare och sjuksköterskor som arbetar på GEA.

Vårdenhetschef och sektionschef ansvarar för att rutinen är känd och efterföljs.

Granskare/arbetsgrupp

Svein-Olav Bratlie Sektionschef Övre abdominiell kirurgi

Andreas Pischel Överläkare GEA

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Specialistmedicin

Innehållsansvar: Gisela Ringström, (gisri), Vårdenhetschef

Granskad av: Svein Olav Bratlie, (svebr1), Sektionschef

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9882-597462984-30

Version: 9.0

Giltig från: 2025-06-13

Giltig till: 2027-06-05