

Gäller för: Gastroenterologisk endoskopimottagning Sahlgrenska

Giltig från: 2025-05-27

Innehållsansvar: Gisela Ringström, (gisri), Vårdenhetschef

Giltig till: 2027-05-26

Granskad av: Per Hedenström, (perhe14), Sektionschef

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

Gastroskopi – Patientinformation 125

Revideringar i denna version

Inga ändringar

Syfte

Patientinformation för ineliggande patienter som ska göra gastroskopi

Gastroskopi

Vad är Gastroskopi?

Gastroskopi är en undersökning av matstrupe, magsäck och tolvfingertarm. Vid undersökningen används ett instrument som kallas för endoskop. Ett endoskop är en böjlig slang som är knappt en centimeter i diameter. Längst fram finns en liten videokamera som överför bilder av tarmens slemhinna till en TV-skärm. I samband med undersökningen kan det även tas prover och utföras behandling av förändringar i eller på slemhinnan.

Förberedelser inför Gastroskopi:

Du får **inte äta något på 6 timmar före undersökningen** men du får dricka vatten fram tills 2 timmar före undersökningsstart.

Vi erbjuder lugnande/smärtstillande medicin i samband med undersökningen. Det är då **EJ** tillåtet att köra bil under resten av dagen efter denna medicinering.

OBS! Du som medicinerar med:

Någon typ av blodförtunnande medicin, informera sjuksköterskan på avdelningen om detta.

Andra mediciner kan du ta som vanligt på undersökningsdagen dock inte senare än 2 timmar före undersökning.

Hur går undersökningen till?

Vid gastroskopi sprayas först lokalbedövning i svalget. Därefter ges lugnande/smärtstillande medicin om du önskar det. Under gastroskopin ligger du på vänster sida. Undersökningen tar ca 5-10 minuter men kan också ta längre tid beroende på undersökning och behandling.

Efter undersökningen

Magen kan kännas spänd och uppblåst, obehagen lättar allt eftersom gasen kommer ut. Vanligtvis kan du äta och dricka en timma efter lokalbedövningen i svalget.

Efter undersökning ges muntligt och skriftligt besked om vad som är utfört. Lugnande och smärtstillande läkemedel kan orsaka en minneslucka. Det är därför vanligt att inte komma ihåg själva undersökningen eller information du får i anslutning till undersökningen om du väljer att få denna medicin.

Granskare/arbetsgrupp

Per Hedenström, Sektionschef Gastroenterologi och
hepatologi/Medicin/område 6, Axel Josefsson VÖL GEA, Gisela
Ringström VEC GEA

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Gastroenterologisk endoskopimottagning
Sahlgrenska

Innehållsansvar: Gisela Ringström, (gisri), Vårdenhetschef

Granskad av: Per Hedenström, (perhe14), Sektionschef

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9882-597462984-38

Version: 5.0

Giltig från: 2025-05-27

Giltig till: 2027-05-26