

Gäller för: Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra

Giltig från: 2025-09-16

Innehållsansvar: Linnea Svensson, (linsv31), Enhetschef

Giltig till: 2027-09-15

Granskad av: Sandra Elverlind, (sanel7), Koordinator

Godkänd av: Sofia Ekdahl, (sofek1), Verksamhetschef

Checklista inför endoskopi på GEA

(se sid 2 för förtydligande)

Datum: _____

Avd: _____

 Koloskopi Gastroskopi Sigmoideskopi PEG _____Blodsmitta: Ja _____ NejÖverkänslighet: Ja _____ NejBehandling med blodförtunnande: Ja _____ Togs senast (dat): _____ Nej

Om blodförtunnande eller leversvikt: PK taget datum: _____ Värde: _____

Kommunikation: _____

Hjälp vid förflyttning Ja: _____ NejBiobank: Ja Nej PVK/CVK/Port-A-Cath Andningsproblem Ev luftrörsvidgande spray medskickad Syrgas: _____ liter**Förberedelser inför gastroskopi**

Svält från klockan: _____

Förberedelser inför tarmundersökning Laxabon, mängd: _____ Picoprep Annan rengöring: _____ Kontroll att tarmen är ren. Sign: _____ Järntablett utsatt**Förberedelser inför PEG-inläggning**Svält från klockan: _____ PK taget

Checklistan ifylld av: _____

Förtydliganden till checklistan

Allmänt	Checklistans första del ska alltid vara ifylld inför alla undersökningar. Därefter görs de förberedelser som står under respektive undersökning.
Blodförtunnande	Ange samtliga blodförtunnande mediciner som patienten behandlas med samt när sista dos togs, eller om patienten har leversvikt (och därför kan ha högt spontant PK). Waran [®] , Apekumarol [®] , Marcumar [®] eller Warfarin [®] skall sättas ut 5 dagar före undersökning. PK tas dagen före undersökningen. Plavix [®] , Clopidogrel [®] , Efient [®] , eller Brilique [®] skall sättas ut 5 dagar före undersökning. Inget PK behövs. Xarelto [®] , Eliquis [®] , eller Pradaxa [®] skall sättas ut 1 dag före undersökning. Inget PK behövs. Fragmin [®] , Klexane [®] eller Innohep [®] skall inte ges 24 timmar innan undersökningen. Inget PK behövs. Tromblyl [®] eller Persantin [®] kan ges som vanligt, dock inte om ESD ska göras. Inget PK behövs.
PK	Behöver bara tas på patienter med blodförtunnande i gruppen med Waran enligt ovan, samt patienter med leversvikt och inför PEG-inläggning.
Kommunikation	T.ex. demens, annat språk, hörapparat och dyl.
Förflyttning	Ange om patienten behöver hjälp med att förflytta sig t.ex. mellan säng och brits.
Biobank	Då vi ofta tar prover som omfattas av biobankslagen ska patienten tillfrågas om prover får sparas.
Märkt säng	Alla patienter ska alltid åka i säng till GEA. Sängen ska vara märkt så att patienten läggs i rätt säng efter undersökningen
PVK	CVK och Port-A-Cath accepteras, dock ej dialyskateter.
Järntabletter	Ska vara utsatta 7 dagar före tarmundersökning
Blodprover inför PEG-inläggning	PK ska vara taget dagen före undersökningsdagen.

Tack för hjälpen!

Granskare/Arbetsgrupp

Sofia Kanmert (ssk), Julia Oskarsson (ssk), Gastroenterologisk endoskopimottagning Östra

Per Robertsson, överläkare och VÖL, Gastroenterologisk endoskopimottagning Östra

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning
Östra

Innehållsansvar: Linnea Svensson, (linsv31), Enhetschef

Granskad av: Sandra Elverlind, (sanel7), Koordinator

Godkänd av: Sofia Ekdahl, (sofek1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9882-597462984-5

Version: 11.0

Giltig från: 2025-09-16

Giltig till: 2027-09-15