

Gäller för: Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra

Giltig från: 2026-05-18

Innehållsansvar: Linnea Svensson, (linsv31), Enhetschef

Giltig till: 2028-05-18

Granskad av: Helena Lindegren, (helli14), Endoskopisjuksköterska

Godkänd av: Sofia Ekdahl, (sofek1), Verksamhetschef

# Handläggning av patient med PEG som åkt ut eller krånglar

## Revideringar i denna version

Ändring av personer ansvariga för rutinen och ändringar i vad som gäller om tiden då PEG är anlagd är längre än 8 veckor

## Syfte

Förtydliga vad man gör då en PEG krånglar eller har åkt ut.

## Arbetsbeskrivning

### Dagtid/Vardagar

Om patient inkommer med PEG eller Knapp som åkt ut eller krånglar, ring Gastroenterologisk endoskopimottagning (GEEM) och hör om det är möjligt att skicka patienten dit direkt. Remiss behövs alltid.

### Jour-tid

Handläggs via akutmottagningen enligt följande:

## Om PEG åkt ut

### Är PEG nyanlagd inom 8 veckor från dagens datum:

- Kontakta en kirurg

### Är tiden då PEG är anlagd längre än 8 veckor gör följande:

- Tvätta två gånger med Descutan.
- Sätt en gastrotub, (Compat, Gastrotube Enfit) Storlek 16, 18, eller 20 Fr. (finns på akuten och operation) Om inte dessa finns sätt urinvägskateter 16, 18 eller 20 Fr i stomakanalen då det finns risk att den annars sluter sig snabbt.

- Kuffa gastrotuben med angiven mängd STERILT vatten.
- Kontrollspola matningskanalen med vanligt vatten.
- Skriv remiss till GEEM om en mer permanent lösning önskas. OBS att remissen ska gå till endoskopimottagning i rätt upptagningsområde. Mönldalspatienter hör till SU/Sahlgrenska.

**OBS! PEG som har åkt ur är EJ indikation för inläggning på sjukhus!**

### **PEG som läcker/krånglar**

Vid läckage men kvarstående möjlighet att mata rekommenderas kontakt med GEEM (Kontaktpunkten 031-342 24 00) nästa vardag.

Vid stopp kontrollera PEG- kateterns läge t ex med hjälp av röntgen så att den inte har ändrat läge. Försök att spola igenom PEG- katetern med hjälp av en spruta och vatten. Om det inte går, kläm (mjölka) längs slangen.

Ett tips är att spruta in lite svalt te, kolsyrat vatten eller avslagen Coca-cola som kan lösa upp eventuella matrester. Fungerar inte detta tag kontakt med GEEM nästa vardag, men se till att patienten får tillfällig adekvat försörjning till dess.

## **Ansvar**

Verksamhetschef, Verksamhetsområde Medicin, Geriatrik Akutmottagning Östra, Område MGA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar.

## **Uppföljning, utvärdering och revision**

Vårdenhetschef GEEM ansvarar för att detta dokument uppdateras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

## **Dokumentation**

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

## **Granskare/arbetsgrupp**

Helena Lindegren, endoskopisjuksköterska Gastroenterologisk endoskopimottagning Östra

Styliani Stefanou, sjuksköterska Gastroenterologisk endoskopimottagning Östra

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning  
Östra

**Innehållsansvar:** Linnea Svensson, (linsv31), Enhetschef

**Granskad av:** Helena Lindegren, (helli14),  
Endoskopisjuksköterska

**Godkänd av:** Sofia Ekdahl, (sofek1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9882-597462984-85

**Version:** 13.0

**Giltig från:** 2026-05-18

**Giltig till:** 2028-05-18