

Gäller för: Verksamhet Neurosjukvård

Giltig från: 2024-10-16

Innehållsansvar: Jennifer Samuelsson Råmunddal, (sansa8), Specialistläkare

Giltig till: 2026-10-14

Granskad av: Johan Ljungqvist, (johlj4), Sektionschef

Godkänd av: Åsa Lundgren Nilsson, (asalu3), Verksamhetschef

Generella ordinationer avdelning 10,23

NEU01

Syfte

Patienter skall snabbt kunna få symptomlindring vid tillstånd som inte först behöver bedömas av läkare. Sjuksköterska bedömer om det räcker att diskutera tillståndet med ordinarie läkare vid nästa rond eller om kontakt ska tas med läkare omgående efter administrering av läkemedel.

Ansvar

HSLF-FS 2017:37 Generella direktiv om läkemedelsbehandling

6 § Endast läkare får utfärda generella direktiv om läkemedelsbehandling.

Ett generellt direktiv ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om

1. läkemedelsnamn eller aktiv substans,
2. läkemedelsform,
3. läkemedlets styrka,
4. dosering,
5. maxdos,
6. administreringssätt,
7. indikationer och kontraindikationer.
8. antalet tillfällen som läkemedlet får ges utan att en läkare kontaktas.

Generella direktiv om läkemedelsbehandling ska utfärdas restriktivt och omprövas återkommande.

7 § Innan ett läkemedel med stöd av ett generellt direktiv om läkemedelsbehandling iordningställs och administreras eller överlämnas till en patient ska en sjuksköterska.

1. göra en bedömning av patientens behov av läkemedlet, och

2. kontrollera läkemedlets indikation och kontraindikationer.

Bedömningen ska dokumenteras i Melior.

Ansvarig sjuksköterska är skyldig att känna till informationen i FASS om det aktuella läkemedlet innan det ges till patient.

Läkemedels namn Preparatets namn	Dos Mängd per administrerings tillfälle	Dosenhet t ex st, ml, drp, mg	Antal gånger Administrerings tillfällen per dag	Maxdos Total dygnsdos	Administrations sätt t ex iv, sc, enl ord., im, rektalt	Anvisning Indikation, kontraindikation och ev. annan anmärkning OBS. Högst 240 tecken!
Acetylcystein Brustablett	1	st	3	3	Per os	Indikation: lösa upp segt slem Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen.
Alvedon brustablett 500mg	1-2	st	4	8st	Enligt ordination	Indikation: Smärta samt febernedsättning. OBS! maxdos 6 tabletter (3g) för över 80 år Kontraindikation: Leversjukdom samt överkänslighet se FASS. Annan anmärkning: max 4 gr Paracetamol/per dygn
Alvedon filmdragerad tablett 500mg	1-2	st	4	8 st	Per os	Indikation: Smärta samt febernedsättning. OBS! maxdos 6 tabletter (3g) för över 80 år Kontraindikation: Leversjukdom samt överkänslighet se FASS. Annan anmärkning: max 4 gr Paracetamol/per dygn
Alvedon supp 500mg	1-2	st	4	8 st	Rektalt	Indikation: Smärta samt febernedsättning. OBS! maxdos 6 tabletter (3g) för över 80 år Kontraindikation: Leversjukdom samt överkänslighet se FASS. Annan anmärkning: max 4 gr Paracetamol/per dygn
Buccloam munhålelösning 10 mg	10 mg	mg	2	20mg	Per os	Indikation: Ep-Anfall Kontraindikation: Sömnapné syndrom, Myasthenia gravis, svår andningsinsufficiens, nedsatt leverfunktion Annan anmärkning: kan upprepas efter 15-20 minuter igen vid behov

Cilaxoral orala dr lös 7,5mg/ml	10	drp	1	10 st	Per os	Indikation: Obstipation Kontraindikation: ej vid inklänningsrisk utan läkarkontakt · Annan anmärkning:
Conoxia Medicinsk gas komprimerad 100%	1-2	l/min	1	2 l/min	Nasalt	Indikation: syrgassaturation mindre än 95%, kontakta läkare snarast.1-2L på nästuss eller gramma (ej mask) Kontraindikation: Försiktighet vid KOL Annan anmärkning:
Dulcolax 10mg Supp	1	st	1	1	Rektalt	Indikation: Obstipation Kontraindikation: Ileus, tarmobstruktion, akut IBD, dehydrering, överkänslighet mot den aktiva substansen.
EMLA kräm 25mg/g+25 mg/g	10	cm	1	10 Cm	Utvärtes	Indikation: Ytanestesi vid venprovtagning eller sättande av PVK Kontraindikation: Annan anmärkning:
EMLA plåster 25/mg/25m g	1	st		4 st	Utvärtes	Indikation: Ytanestesi vid venprovtagning eller sättande av PVK Kontraindikation: Annan anmärkning:
Glucos Fresenius Kabi inf 300mg/ml	30	ml	1	30 ml	Intravenöst	Indikation: Hypoglykemi, grav (ej vaken patient). Dosering: 30-50 ml ml iv eller tills patienten vaknat eller b-glucos normalt. Annan anmärkning: Försiktighet vid känd hjärtsjukdom hos äldre patient. Läkarkontakt tas så fort som möjligt. Kontraindikation: Hyperglykemi
Glytrin subl spray 0,4mg/dos	1-2	dos	3	6 doser	Enligt ordination	Indikation: Bröstmärter Spraya på munslemhinnan helst under tungan eller på tungan medan man håller andan Kontraindikation: Systoliskt blodtryck under 105mmHG. Överkänslighet se:FASS Annan anmärkning: OBS! Endast vid kärlkrampssjukdom
Lactulos Meda oral lösn 670mg/ml	30	ml	1	30 ml	Per os	Indikation: Obstipation Kontraindikation: Annan anmärkning: Max antal tillfällen utan läkarkontakt: 1 gång

Madopark Quick mite tabl 50mg/12,5 mg	1-2	st	2	4 st	Per os	Indikation: Hypokinisi/dystoni vid Parkinson Kontraindikation: Annan anmärkning: Max antal tillfällen utan läkar kontakt 2 tabletter 2 gånger/ per dygn
Melatonin Tablett 2 mg	1	st	1	1st	Per oa	Indikation: Sömnstörning Kontraindikation: Autoimmun sjukdom Annan anmärkning: Försiktighet vid polyfarmaci
Microlax klysmå	1	st	1	1	Rektalt	Indikation: Obstipation Kontraindikation: överkänslighet mot den aktiva substansen.
Metoclopra mide	1	dos	3	3 st	Per os	Indikation: Illamående Kontraindikation: Parkinsons sjukdom, Epilepsi, GI-blödning, barn <1 år Annan anmärkning: Överkänslighet se FASS
Movicol Pulver till oral lösning i dospåse	1	dos	3	3 dos	Per os	Indikation: Obstipation Kontraindikation: Perforation el obstruktion, ileus, svåra inflammatoriska tillstånd i tarmen. Annan anmärkning: Överkänslighet se FASS
Nezeril näsdroppar lö end 0,5 mg/ml	1	dos	3	3 doser	Nasalt	Indikation: Nästäppa 1 dospipett i varje näsborre Kontraindikation: Överkänslighet se:FASS Annan anmärkning:
Nystatin oral susp 10000 IU/ml	1	ml	4	4 ml	Per os	Indikation: Svampinfektion i munhålan Kontraindikation: Annan anmärkning: Max antal tillfällen utan läkarkontakt 1 Dygn.
Omeprazol Kapsel 20 mg	1	st	2	2	Per os	Indikation: Halsbränna Kontraindikation: Överkänslighet och interaktioner se FASS · Annan anmärkning: ska inte användas tillsammans med nelfinavir (se avsnitt Interaktioner).
Omnilax pulv oral lösning 10g	1	dos	1	1 dos	Per os	Indikation: Obstipation Kontraindikation: Njursvikt, överkänslighet se FASS

Ondasteron injektions vätska 2mg/ml	2	ml	8	16ml	iv	Indikation: 2ml/4mg ges iv vid illamående. Max dos: 16ml
Oxascand tabl 5 mg	1	st	2	2 st	Per os	Indikation: Tillfällig oro Kontraindikation: Sömnapné Annan anmärkning: Överkänslighet se : FASS Max 1 dygns behandling utan läkarkontakt.
Oxynorm 5 mg kapsel	1	st	3	3	Per os	Indikation: Postoperativ smärtlindring när Alvedon ej har fullgod effekt. Kontra: överkänslighet mot oxikodon, KOL, ileus, andningsdepression.
Panodil Brus Brustabl 500mg	1-2	st	4	8 st	Enligt ordination	Indikation: Smärta samt febernedsättning. OBS! maxdos 6 tabletter (3g) för över 80 år Kontraindikation: Leversjukdom samt överkänslighet se FASS. Annan anmärkning: max 4 gr Paracetamol/per dygn
Panodil filmdrag tabl 500mg	1-2	st	4	8 st	Per os	Indikation: Smärta samt febernedsättning. OBS! maxdos 6 tabletter (3g) för över 80 år Kontraindikation: Leversjukdom samt överkänslighet se FASS. Annan anmärkning: max 4 gr Paracetamol/per dygn
Pevaryl kräm 1%	1	dos	2	2 doser	Utvärtes	Indikation: Vid misstanke om svampinfektion på hud Kontraindikation: Annan anmärkning: Max 3 dygns behandling utan läkarkontakt
Propavan tabl 25 mg	1	st	1	1 st	Per os	Indikation: Insomningssvårigheter. Max 1 tablett till natten. Kontraindikation: Ej vid Parkinson. undvik att ge till patienter 75 år och äldre
Resulax rektallösn 8,5g	1	dos	2	2 doser	Rektalt	Indikation: Förstoppning Kontraindikation: Annan anmärkning

Ringer-Acetat Infusions- vätska	1000ml	ml	1	1000ml	iv	Indikation: Pre-Op. (fördröjd operation). Gäller ej diabetiker.
Stesolid novum inj emuls 5mg/ml	0,5-1	ml	1	1 ml	iv	Indikation: Vid akuta krampanfall, injektionshastighet 1ml/min. Kontraindikation: Ej vid anfällsregistrering Anmärkning: försiktighet vid behandling av äldre, vid nedsatt lever och njurfunktion, ALS och myastenia gravis
Tavegyl 1mg tablett	1	st	3	3	Per os	Indikation: Allergiska utslag. Klåda. Kontraindikation: överkänslighet mot den aktiva substansen.
Xylocain utan konserverin gsmedel gel 2%	5-20	ml	2	40 ml	Lokalt	Indikation: Urin katetrering Män: ca 20 ml, kvinnor: ca 5-10ml Kontraindikation: se: FASS Annan anmärkning:
Xyloproct supp	1	st	1	1 st	Rektalt	Indikation: Hemorroider. Max antal tillfällen utan läkarkontakt 1ggr/dygn
Zopiklon 5mg	1	st.	1	1 st	Per os	Indikation: Sömnproblem Kontraindikation: Sömnapné syndrom, grav leversvikt, Myastenia gravis. Överkänslighet se FASS Annan anmärkning: OBS! Endast tillfällig användning

Ansvarigs underskrift: _____

Ansvarigs namnförtydligande: **Jennifer Samuelsson, VÖL**

Uppföljning, utvärdering och revision

Medvetet avsteg från rutinen ska dokumenteras i Melior och även rapporteras i MedControlPRO.

Relaterad information

Listan för generella ordinationer är identisk med lista i Meliors läkemedelsmodul för enheten.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

<https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201737-om-ordination-och-hantering-av-lakemedel-i-halso--och-sjukvarden/>

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Neurosjukvård

Innehållsansvar: Jennifer Samuelsson Råmunddal, (sansa8),
Specialistläkare

Granskad av: Johan Ljungqvist, (johlj4), Sektionschef

Godkänd av: Åsa Lundgren Nilsson, (asalu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9906-1676734750-54

Version: 6.0

Giltig från: 2024-10-16

Giltig till: 2026-10-14