

Gäller för: Verksamhet Neurosjukvård

Innehållsansvar: Magnus Johnsson, (magjo41), Specialistläkare

Granskad av: Krister Ewaldsson, (chrew), Sektionschef

Godkänd av: Åsa Lundgren Nilsson, (asalu3), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-12-02

Giltig till: 2026-12-02

Generella ordinationer

Neurodagsjukvård NEU07

Rutin godkänd av

Mikael Edsbagge, medicinskt ansvarig Neurosjukvården

Syfte

Patienter skall snabbt kunna få symptomlindring vid tillstånd som inte först behöver bedömas av läkare.

Sjuksköterska bedömer om det räcker att diskutera tillståndet med ordinarie läkare vid nästa rond eller om kontakt ska tas med läkare omgående efter administrering av läkemedel.

Ansvar

HSLF-FS 2017:37 Generella direktiv om läkemedelsbehandling

6 § Endast läkare får utfärda generella direktiv om läkemedelsbehandling.

Ett generellt direktiv ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om

1. läkemedelsnamn eller aktiv substans,
2. läkemedelsform,
3. läkemedlets styrka,
4. dosering,
5. maxdos,
6. administreringssätt,
7. indikationer och kontraindikationer.
8. antalet tillfällen som läkemedlet får ges utan att en läkare kontaktas.

Generella direktiv om läkemedelsbehandling ska utfärdas restriktivt och omprövas återkommande.

7 § Innan ett läkemedel med stöd av ett generellt direktiv om läkemedelsbehandling iordningställs och administreras eller överlämnas till en patient ska en sjuksköterska.

1. göra en bedömning av patientens behov av läkemedlet, och
2. kontrollera läkemedlets indikation och kontraindikationer.

Bedömningen ska dokumenteras i Melior.

Ansvarig sjuksköterska är skyldig att känna till informationen i FASS om det aktuella läkemedlet innan det ges till patient.

Läkemedels namn Preparatets namn	Dos Mängd per administrations tillfälle	Dose nhet t ex st, ml, drp, mg	Antal gånger Administerings tillfällen per dag	Maxdos Total dygnsdos	Admin istra- tionss ätt t ex iv, sc, enl ord., im, rektalt	Anvisning Indikation, kontraindikation och ev. annan anmärkning OBS. Högst 240 tecken!
Alvedon brustablett 500mg	1-2	st	4	8st	Enligt ordination	Indikation: Smärta samt febernedsättning. OBS! maxdos 6 tabletter (3g) för över 80 år Kontraindikation: Leversjukdom samt överkänslighet se FASS. Annan anmärkning: max 4 gr Paracetamol/per dygn
Alvedon filmdragerad tablett 500mg	1-2	st	4	8 st	Per os	Indikation: Smärta samt febernedsättning. OBS! maxdos 6 tabletter (3g) för över 80 år Kontraindikation: Leversjukdom samt överkänslighet se FASS. Annan anmärkning: max 4 gr Paracetamol/per dygn
Alvedon supp 500mg	1-2	st	4	8 st	Rektalt	Indikation: Smärta samt febernedsättning. OBS! maxdos 6 tabletter (3g) för över 80 år Kontraindikation: Leversjukdom samt överkänslighet se FASS. Annan anmärkning: max 4 gr Paracetamol/per dygn

T.Betapred 0,5 mg	4	St	1	4st	Per os	Indikation: Reaktion på Rituximab Kontraindikation: Överkänslighet Annan anmärkning: Löses i vatten
Buccolam munhåle Lösning 10 mg	10	mg	2	20mg	Oral anvån dning	Indikationer: Långvarigt epileptiskt anfall vid EP. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, benso. eller hjälpämne som anges under Innehåll. Myasthenia gravis, andningsinsuff, Sömnapné synd, Svårt nedsatt leverfunkt
Caredin 2,5 mg mun- sönderfalla nde	2	St	1	2st	Per os	Indikation: Förbehandling Kontraindikation: Allergisk reaktion Annan anmärkning: Tabletten ska tas omedelbart efter blister öppnas
Cetirizin tablett 10 mg	1	st	1	1 st	Per os	Indikation: Vid klåda och allergi till vuxna Kontraindikation: patienter med nedsatt njurfunktion Annan anmärkning: ej barn under 6 år
Conoxia Medicinsk gas komprimerad 100%	1-2	l/mi n	1	2 l /min	Nasalt	Indikation: syrgassaturation mindre än 95%, kontakta läkare snarast.1-2L på nästuss eller grimma (ej mask) Kontraindikation: Försiktighet vid KOL Annan anmärkning:
Diazepam rektallösning 5 mg	5-10	mg	2	10 mg	Rektal t	Indikation: Vid akuta krampanfall då patient ej har PVK Kontraindikation: Annan anmärkning: Ej vid anfallsregistrering
Glucos 50 mg/ml	1000	ml	1	1000	iv	Indikationer: Dehydrering. Kontraindikation: obehandlad diabetes, osv se FASS Annan anmärkning: Vuxna rekommenderas en maximal infusionshastighet på 0,25 g glukos/kg kroppsvikt/timme med en maximal daglig dos på 6 g glukos/kg kroppsvikt.
Ibuprofen Tablett 400mg	1	st	3	3	po	Indikationer: Smärta, inflammation, feber, Kontraindikationer: Pågående eller tidigare GI-blödning, svår lever, njur- eller hjärtsjukdom, överkänslig mot ASA eller NSAID preparat, tillstånd med ökad blödningsbenägenhet, 3:e trimester av graviditet
Ringer - Acetat	1000	ml	1	1000 ml	iv	Indikationer: Vätske- och elektrolytersättning vid tillstånd med orubbad syra-basbalans eller lindrig acidosis. Kontraindikationer: Se FASS hyperhydreringstillstånd, hyperkalemi, Annan anmärkning: Följ elektrolyter

Stesolid novum inj emuls 5mg/ml	0,5-1 ml	ml	1	1ml	Intravenöst	Indikation: Vid akuta krampanfall som varat längre än 3 minuter, injektionshastighet 1ml/min. Därefter kontakta läkare. Annan anmärkning: försiktighet vid behandling av följande patienter: äldre, nedsatt lever och njurfunktion och Myastenia Gravis.
Tapin kräm 25mg/g+25mg/g	10	cm	1	10 Cm	Utvärt es	Indikation: Ytanestesi vid venprovtagning eller sättande av PVK Kontraindikation: Annan anmärkning:
Tapin plåster 25/mg/25mg	1	st		4 st	Utvärt es	Indikation: Ytanestesi vid venprovtagning eller sättande av PVK Kontraindikation: Annan anmärkning:
Xylocain utan konserveringsmedel gel 2%	5-20	ml	2	40 ml	Lokalt	Indikation: Urin katetrisering Män: ca 20 ml, kvinnor: ca 5-10ml Kontraindikation: se: FASS Annan anmärkning:
Zofran Tablett 4mg	1-2	st	2	4	Per os	Indikation: Ges vid illamående vid intravenös behandling (IvIg) Kontraindikation: Överkänslighet Annan anmärkning; Den totala dygnsdosen får inte överstiga vuxendosen på 32 mg.

Ansvarigs underskrift: _____

Ansvarigs namnförtydligande: **Magnus Johnsson VÖL**

Uppföljning, utvärdering och revision

Medvetet avsteg från rutinen ska dokumenteras i Melior och även rapporteras i MedControlPRO.

Relaterad information

Listan för generella ordinationer är identisk med lista i Meliors läkemedelsmodul för enheten.

<https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201737-om-ordination-och-hantering-av-lakemedel-i-halso--och-sjukvarden/>

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Neurosjukvård

Innehållsansvar: Magnus Johnsson, (magjo41), Specialistläkare

Granskad av: Krister Ewaldsson, (chrew), Sektionschef

Godkänd av: Åsa Lundgren Nilsson, (asalu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9906-1676734750-57

Version: 4.0

Giltig från: 2024-12-02

Giltig till: 2026-12-02