

Gäller för: Verksamhet Neurosjukvård

Giltig från: 2024-11-26

Innehållsansvar: Krister Ewaldsson, (chrew), Sektionschef

Giltig till: 2026-11-26

Granskad av: Annika Nordanstig, (annno71), Sektionschef

Godkänd av: Åsa Lundgren Nilsson, (asalu3), Verksamhetschef

Generella ordinationer

Neuromottagningen NEU05

Rutin godkänd av

Mikael Edsbagge, medicinsk ansvarig Neurosjukvården

Syfte

Patienter skall snabbt kunna få symptomlindring vid tillstånd som inte först behöver bedömas av läkare.

Sjuksköterska bedömer om det räcker att diskutera tillståndet med ordinarie läkare vid nästa rond eller om kontakt ska tas med läkare omgående efter administrering av läkemedel.

Ansvar

HSLF-FS 2017:37 Generella direktiv om läkemedelsbehandling

6 § Endast läkare får utfärda generella direktiv om läkemedelsbehandling.

Ett generellt direktiv ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om

1. läkemedelsnamn eller aktiv substans,
2. läkemedelsform,
3. läkemedlets styrka,
4. dosering,
5. maxdos,
6. administreringsätt,
7. indikationer och kontraindikationer.
8. antalet tillfällen som läkemedlet får ges utan att en läkare kontaktas.

Generella direktiv om läkemedelsbehandling ska utfärdas restriktivt och omprövas återkommande.

7 § Innan ett läkemedel med stöd av ett generellt direktiv om läkemedelsbehandling iordningställs och administreras eller överlämnas till en patient ska en sjuksköterska:

1. göra en bedömning av patientens behov av läkemedlet, och
2. kontrollera läkemedlets indikation och kontraindikationer.

Bedömningen ska dokumenteras i Melior.

Ansvarig sjuksköterska är skyldig att känna till informationen i FASS om det aktuella läkemedlet innan det ges till patient.

Arbetsbeskrivning

Läkemedels namn Preparatets namn	Dos Mängd per administrations tillfälle	Dose nhet t ex st, ml, drp, mg	Antal gånger Administerings tillfällen per dag	Max dos Total dygns dos	Admin istrationss ätt t ex iv, sc, enl ord., im, rektalt	Anvisning Indikation, kontraindikation och ev. annan anmärkning OBS. Högst 240 tecken!
Alvedon brustablett 500mg	1-2	st	4	8st	Enligt ordination	Indikation: Smärta samt febernedsättning. OBS! maxdos 6 tabletter (3g) för över 80 år Kontraindikation: Leversjukdom samt överkänslighet se FASS. Annan anmärkning: max 4 gr Paracetamol/per dygn
Alvedon filmdragerad tablett 500mg	1-2	st	4	8 st	Per os	Indikation: Smärta samt febernedsättning. OBS! maxdos 6 tabletter (3g) för över 80 år Kontraindikation: Leversjukdom samt överkänslighet se FASS. Annan anmärkning: max 4 gr Paracetamol/per dygn
Buccolam munhåle Lösning 10 mg	10	mg	1	20 mg	Oral användning	Indikationer: Krampanfall Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, bensodiazepiner eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll. Myasthenia gravis, Svår andningsinsufficiens, Sömnapné syndrom, Svårt nedsatt leverfunktion Annan Anmärkning:
Cetirizin 10 mg	1	st	1	1 st	Per os	Indikation: Vid klåda och allergi till vuxna Kontraindikation: patienter med nedsatt njurfunktion · Annan anmärkning: ej barn under 6 år
EMLA kräm 25mg/g+25 mg/g	10	cm	1	10 Cm	Utvärtes	Indikation: Ytanestesi vid venprovtagning eller sättande av PVK Kontraindikation: Annan anmärkning:

EMLA plåster 25/mg/25m g	1	st		4 st	Utvärt es	Indikation: Ytanestesi vid venprovtagning eller sättande av PVK Kontraindikation: Annan anmärkning:
Ibuprofen 400 mg Tabl	1	st	1	1	Per os	Indikation: Profylax mot influensasymtom vid MS behandling Kontraindikation: Överkänslighet, nedsatt njurfunktion, hjärtsvikt, leverdysfunktion, tidigare magsår. Annan anmärkning:
Madopark Quick Mite Tabl 50mg/12,5 mg	1-2	st	1	2st	Per os	Indikation: Parkinsons sjukdom Kontraindikation: Överkänslighet samt ej samtidig behandling med icke selektiva MAO-hämmare. Annan anmärkning: Se FASS
Panodil Brus Brustabl 500mg	1-2	st	4	8 st	Enligt ordina tion	Indikation: Smärta samt febernedsättning. OBS! maxdos 6 tabletter (3g) för över 80 år Kontraindikation: Leversjukdom samt överkänslighet se FASS. Annan anmärkning: max 4 gr Paracetamol/per dygn
Panodil filmdrag tabl 500mg	1-2	st	4	8 st	Per os	Indikation: Smärta samt febernedsättning. OBS! maxdos 6 tabletter (3g) för över 80 år Kontraindikation: Leversjukdom samt överkänslighet se FASS. Annan anmärkning: max 4 gr Paracetamol/per dygn
Stesolid Tablett 5mg	1	st	1	1	Per os	Indikation: Oro vid undersökning. Kontraindikation: Överkänslighet se FASS. Annan anmärkning: Max 1 dygns behandling utan läkarkontakt.
Tavegyl Tablett 1mg	1	st	2	2	Per os	Indikation: Premedicinering inför Rituximab Kontraindikationer: Se FASS. Försiktighet vid trångvinkelglaukom, stenoserande peptiskt sår, pyloroduodenal obstruktion, prostatahyperplasi med urinretention, blåshalsobstruktion, Myasthenia gravis, porfyri.
Xylocain utan konserverin gsmedel gel 2%	5-20	cm	2	40 cm	Lokalt	Indikation: Urin katetrisering Män: ca 20 ml, kvinnor: ca 5-10ml Kontraindikation: se: FASS Annan anmärkning:

Ansvarigs underskrift: _____

Ansvarigs namnförtydligande: **Krister Ewaldsson**

Uppföljning, utvärdering och revision

Medvetet avsteg från rutinen ska dokumenteras i Melior och även rapporteras i MedControlPRO

Relaterad information

Listan för generella ordinationer är identisk med lista i Meliors läkemedelsmodul för enheten.

<https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201737-om-ordination-och-hantering-av-lakemedel-i-halso--och-sjukvarden/>

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Neurosjukvård

Innehållsansvar: Krister Ewaldsson, (chrew), Sektionschef

Granskad av: Annika Nordanstig, (annno71), Sektionschef

Godkänd av: Åsa Lundgren Nilsson, (asalu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9906-1676734750-58

Version: 4.0

Giltig från: 2024-11-26

Giltig till: 2026-11-26