

Gäller för: Verksamhet Ambulans och specialiserad sjukvård i hemmet, Palliativt resursteam Högsbo, ASIH Högsbo
Innehållsansvar: Tove Eneljung, (toven), Överläkare
Godkänd av: Elisabet Hammar, (eliha30), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-01-29

Giltig till: 2028-01-29

Palliativ medicin – Ordination enligt generella behandlingsdirektiv

Förändringar sedan föregående version

Tillägg indikation Smärta gjord. Verksamhetsnamn korrigerat.

Bakgrund och syfte

Läkemedel som får ges, efter behovsprövning av sjuksköterska, till vuxna patienter inskrivna i vårdenheter inom Palliativ medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läkemedel får ges som enstaka ordination och ej regelbundet till samma patient. Given dos skall dokumenteras av sjuksköterska och dosen skall i efterhand meddelas ansvarig läkare. Vid fortsatt behov ska patientansvarig läkare eller jourläkare rådfrågas för ordination.

Förutsättningar

Ansvariga sjuksköterskor på vårdenheterna inom Palliativ medicin samt ansvariga sjuksköterskor på Helhetsvården Bräcke hospice, Kålltorps hospice och Änggårdens hospice ansvarar för att utföra arbetet enligt gällande rutin.

Sektionschef Palliativ Medicin ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Verksamhetschefen verksamhet Ambulans och specialiserad sjukvård i hemmet ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Generella ordinationer

Vid indikation allergi: Se Styrande dokument ”Palliativ medicin – Allergisk reaktion”.

INDIKATION	LÄKEMEDEL	DOSERING	ANTAL TILFÄLLEN	UPPMÄRKSAMMA
Diarré	Loperamid tabl. 2 mg	1-2 tabletter	Max 3 ggr	Uteslut förstoppningsdiarré eller infektiös diarré.
Förstoppning	Resulax rektallösn. (sorbitol), 8,5 g	1 st	Ett	Inget av preparaten ska ges vid svåra buksmärtor och misstanke om ileus.
	Cilaxoral lösning 7,5 mg/ml (natriumpikosulfat)	8–10 droppar	Ett	
	Klyx rektallösning	1 stycken	Ett	
	Dospulver Movicol	1 stycken	Ett	
	Dulcolax, supp, 10 mg	1 stycken	Ett	
Hypoglykemi (ej vaken patient)	Glucos inj. 300 mg/ml (glucos)	10–80 ml	Ett	Glucos i.v. ges i första hand tills patienten vaknar. Om ej fri venväg överväg Glucagon i.m. Kontakta läkare. Följ p-glukos.
	<i>alternativt</i>			
	Glucagon inj. 1 mg (glucagon)	1 mg i.m. eller s.c.	Ett	
Illamående	Primperan tabl 10 mg	1 tablett	Ett	Uteslut ileus.
	Primperan inj. 5 mg/ml	2 ml s.c./iv	Ett	
Klåda	Desloratadin, 5 mg	1 tablett	Max 2 ggr	
Kramper	Buccolam, munhålelösning 10 mg	1 oral spruta	Ett	
Kärlkramp	Nitrolingualspray 0,4 mg/dos (glyceryltrinitrat)	1–2 spraydoser på munslemhinnan	Ett	Bör ej ges vid systoliskt blodtryck <100 mm Hg. Vid avsaknad av effekt inom 10 minuter kontakta läkare.
Lungödem	Furix inj.vätska 10 mg/ml	4–8 ml iv alt. i.m.	Max 1 gång	Kan ges oavsett blodtryck. Kontakta sedan läkare.

Fortsättning Nästa sida

INDIKATION	LÄKEMEDEL	DOSERING	ANTAL TILLFÄLLEN	UPPMÄRKSAMMA
Smärta	OxyNorm kapsel 5 mg	1 kapsel	Ett	Opioidmissbruk, opioidnaiv patient med syrgas
Smärta/Feber	Alvedon tabl. 500 mg (paracetamol)	1–2 tabletter	Max 3 ggr	Ges ej vid buksmärtor eller grav leverinsufficiens. Ges ej i kombination med andra läkemedel innehållande paracetamol.
	<i>alternativt</i> Paracetamol supp. 1g (paracetamol)	1 supp.	Max 3 ggr	
Sömn	Zopiklon tabl. 5 mg (zopiklon)	1 tablett	Ett	Ges ej vid grav leverinsufficiens, sömnapné, respiratorisk insufficiens, myastenia gravis.
Ångest/Oro	Oxascand tabl. 5 mg (oxazepam)	1 tablett	Max 2 ggr	

Avsteg från rutin

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i journalsystemet om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Ansvar för spridning och implementering har respektive sektionschef och vårdenhetschef. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Uppföljning

Uppföljning, utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske vid behov, dock senast två år efter godkännande. Ansvar för revidering har sektionschefen för Palliativ medicin eller av denne utsedd person.

Relaterad information

Styrande dokument ”Palliativ medicin – Allergisk reaktion”

Arbetsgrupp

Framtagen av: Tove Eneljung, verksamhetsöverläkare, Barbro Ingemarsdotter Fredriksson verksamhetsöverläkare, Eva-Britt Furved, sjuksköterska, Alexandra Midsäter, sjuksköterska, deltagare i Läkemedelsgruppen palliativ medicin. Alla verksamma på Palliativ medicin, verksamhet Ambulans och specialiserad sjukvård i hemmet, område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Ambulans och specialiserad sjukvård i hemmet, Palliativt resursteam Högsbo, ASIH Högsbo

Innehållsansvar: Tove Eneljung, (toven), Överläkare

Godkänd av: Elisabet Hammar, (eliha30), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9907-818264985-5

Version: 14.0

Giltig från: 2026-01-29

Giltig till: 2028-01-29