

Vårdhygien - Luftvägssmitta

Regiongemensam vårdhygienisk riktlinje

Regional rekommendation för sjukhusvård, primärvård samt kommunal vård och omsorg i Västra Götalandsregionen. Framtagen av vårdhygienenheterna i Västra Götaland.

Förändringar sedan föregående version

Ersätter tidigare version, senast uppdaterad 2023-10-17. Endast redaktionella förtydliganden.

Sammanfattning

För att undvika smittspridning i samband med luftvägsinfektioner behöver basala hygienrutiner kompletteras med särskilda skyddsåtgärder. Syftet med riktlinjen är att förhindra smittspridning via luftvägarna inom vård och omsorg.

Bakgrund

Personer med hosta, snuva och feber kan bära smitta i luftvägarna som kan överföras mellan människor. Patientplacering och val av skyddsutrustning utgår från anamnes, klinisk bild, riskbedömning och konsekvens.

Smittspridning från luftvägarna kan ske genom så kallad luftburen smitta, droppsmitta och kontaktsmitta (direkt eller indirekt). I praktiken finns dock ingen tydlig gräns mellan smittvägarna. Flera andra faktorer till exempel infektionsdos, grad av exponering, ventilation, aerosolgenererande arbetsmoment och luftfuktighet har betydelse för att smittspridning kan ske. För mer information om smittvägar se [Smittvägar - Vårdhandboken](#) avsnitt Smitta via luftvägar.

Exempel på sjukdomar som har förmåga att smitta via inandning (luftburen smitta) på längre avstånd är mässling, vattkoppor och smittsam tuberkulos (se

respektive rutin). Andningsskydd är viktigt för att bryta denna smittväg och om möjligt placering i eget rum med ventilation för luftburen smitta.

Sjukdom vars smittväg inte primärt uppfattas som luftburen, men där konsekvensen av infektion är stor eller smittväg är okänd innebär att rutiner som vid luftburen smitta följs (AFS 2023:10). Exempelvis [Viral hemorragisk feber \(VHF\)](#) och [Mers](#) (se respektive rutin). Detta kan komma att gälla vid nyupptäckt infektionssjukdom.

Den vanligaste smittvägen via luftvägar är genom nära kontakt med droppar så kallad droppsmitta. Som regel är risken för smittspridning låg vid avstånd >2 meter. Vissa infektioner med droppsmitta som huvudsaklig smittväg är särskilt relevanta inom vård- och omsorg, och har därför separata vårdhygieniska rutiner, till exempel [influenza](#), [kikhosta](#), [RS- virusinfektion](#) och [covid-19](#), se respektive rutin.

Andra smittämnen exempelvis Metapneumovirus, Parainfluensa, Rhinovirus, Mykoplasma hanteras likvärdigt enligt denna rutin, se nedan ”Vid övrig luftvägssmitta”.

Utförande

Vid misstanke på mässling, vattkoppor och smittsam tuberkulos (luftburen smitta)

För att begränsa smittspridning via luftvägarna är det viktigt att sjukvårdspersonal är observant på personer med symtom från luftvägarna, i synnerhet i kombination med *feber och/eller hudutslag*. Dessa personer ska inte vistas i väntrum utan tas direkt in på eget rum alternativt, om situationen tillåter, undersökas utomhus.

- Placera patienten i isoleringsrum för luftburen smitta helst med ingång till rummet utifrån. Om det inte finns ska patienten placeras och vistas på eget rum med stängd dörr. Gör om möjligt alla undersökningar på rummet.
- [Grundläggande vårdhygieniska principer](#) gäller.
- Smittsambetsbedömning görs av medicinskt ansvarig läkare, vid behov i samråd med infektionsläkare.

Om misstanken kvarstår

- Se respektive rutin mässling, vattkoppor och smittsam tuberkulos.
- Fortsatt vård sker i isoleringsrum med sluss för luftburen smitta.
- Vid transport instrueras patienten i host- och handhygien och förses med engångsnäsdukar och plastpåse för uppsamling av dessa. Patient som tolererar munskydd kan förses med detta. Munskydd är extra angeläget för patient som inte kan medverka i hosthygien.
- Informera mottagande enhet och undvik väntetider.
- Transport inom sjukhus sker om möjligt utomhus. Vid ambulanstransport bör luckan mellan förarhytt och ambulansutrymmet vara stängd.
- Nästa patient tas in på rummet efter tidigast två timmar. I rum med högre antal luftväxlingar kan intervallet vara kortare, t.ex. 20 minuter på operationsrum.

Skyddsutrustning

- Andningsskydd (FFP3) används av alla i rummet. Se [Instruktion för användning av andningsskydd](#).
- Visir/skyddsglasögon används vid nära kontakt.

Vid övrig luftvägssmitta (s.k. droppsmitta)

Smittsambetsbedömning görs av medicinskt ansvarig läkare, vid behov i samråd med infektionsläkare.

- [Grundläggande vårdhygieniska principer](#) gäller.
- Patienter med akuta luftvägssymtom bör placeras på eget rum med stängd dörr.
 - Flera patienter med bekräftad luftvägsinfektion av samma typ kan vårdas i samma rum, förutsatt att annan smitta inte förekommer.
 - Mobilisering kan ske utanför rummet förutsatt att ingen annan utsätts för smitta. Patient kan förses med munskydd (om det tolereras).

Skyddsutrustning

- Vätskeavvisande munskydd (IIR) i kombination med skyddsglasögon/heltäckande visir används
 - vid nära kontakt (inom 2 meter). Se [Munskydd praktisk hantering](#).

- Andningsskydd (FFP2 eller FFP3) med heltäckande visir används:
 - vid arbetsmoment med ökad risk för aerosolbildning t.ex. vid sugning från nedre luftvägarna, trakeotomering, intubering/extubering, bronkoskopi.
 - dessutom utifrån riskbedömning vid kraftig hosta, nyinsjuknad patient särskilt i trångt utrymme, när flera smittsamma vårdas på samma rum eller vid längre vårdinsats t.ex. vid vak.

Se [Instruktion för användning av andningsskydd](#) och [Skyddsutrustning vid vård av patient med luftvägssymtom](#).

Transport

- Vid transport av patient använder personal skyddsutrustning enligt ovan.
- Vid transport instrueras patienten i host- och handhygien och förses med engångsnäsdukar och plastpåse för uppsamling av dessa. Patient som tolererar munskydd kan förses med detta. Munskydd är extra angeläget för patient som inte kan medverka i hosthygien.
- Informera mottagande enhet och minimera risk att exponera andra personer för smitta, t.ex. undvik väntetider.
- Vid flytt till annan enhet, informera om pågående infektion och när personen bedöms som smittfri.

Ansvar och avsteg

- Linjechef ansvarar för att denna rutin är känd och följs av alla medarbetare.
- Enhetens linjechef (vårdenhetschef eller motsvarande) ansvarar för att kringpersonal (lokalvård, receptarie med flera) får information om eventuell skyddsutrustning.
- Medvetet avsteg från denna riktlinje dokumenteras i patientjournal om avsteg är kopplat till patient. Annan orsak till avsteg rapporteras i MedControl PRO eller befintligt avvikelshanteringssystem.

Relaterad information

[Covid-19 - vårdhygieniska rekommendationer](#). Regional rutin

[Instruktion för användning av andningsskydd](#). Regional instruktion

[Munskydd praktisk hantering](#). Regional instruktion

[Skyddsutrustning vid vård av patient med luftvägssymtom](#). Regionalt bildstöd

[Smittvägar/smitta via luftvägar](#). Vårdhandboken

[Vårdhygien - Grundläggande vårdhygieniska principer](#). Riktlinje

[Vårdhygien - Influensa](#). Rutin

[Vårdhygien - Kikhosta](#). Rutin

[Vårdhygien - MERS](#). Rutin

[Vårdhygien - RS- virusinfektion](#). Rutin

[Vårdhygien - Viral hemorragisk feber \(VHF\) t.ex. Ebola, Marburg, Lassa och Krim-Kongo](#). Rutin

Tillämpliga lagar, föreskrifter eller externa riktlinjer

[Aerosolgenererande arbetsmoment](#). Socialstyrelsen

[\(AFS 2023:10\) Risker i arbetsmiljön, Avdelning VI: Smitta](#). Stockholm: Arbetsmiljöverket

[\(AFS 2023:11\) Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning. 15 kap](#). Stockholm: Arbetsmiljöverket

[\(SOSFS 2015:10\) Basal hygien i vård och omsorg](#). Stockholm: Socialstyrelsen

[Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg](#). Folkhälsomyndigheten

Arbetsgrupp

Annett Ekman Persson, hygiensjuksköterska, Vårdhygien Skaraborgssjukhus

Elisabeth Eriksson Gebring, hygiensjuksköterska, Vårdhygien NU- sjukvården

Roseli Sandbreck, hygiensjuksköterska, Vårdhygien SU

Susanne Roos, hygiensjuksköterska, Vårdhygien Södra Älvsborgs sjukhus

Granskare

Julia Lenzen, hygienläkare Vårdhygien Skaraborgssjukhus

Ingemar Qvarfordt, hygienläkare Vårdhygien Sahlgrenska universitetssjukhuset

Godkänt av

Capio Lundby Specialistsjukhus

Carlanderska sjukhuset

Habilitering & Hälsa

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sjukhusen i väster

Inger Holm Gunnarsson, chefläkare

Karin Möller, chefläkare

Anne-Berit Ekström, chefläkare

Anneli Fagerberg, chefläkare

Philipp Meijering, chefläkare

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Innehållsansvar: Nahid Kondori, (nahko1), Enhetschef

Granskad av: Ingemar Qvarfordt, (ingqv),
Universitetssjukhusöverläkare

Godkänd av: Anneli Fagerberg, (annfa26), Chefläkare

Dokument-ID: SU9992-381335686-150

Version: 3.0

Giltig från: 2025-01-20

Giltig till: 2027-01-20