

Gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Innehållsansvar: Nahid Kondori, (nahko1), Enhetschef
Granskad av: Sofia Myhrman, (sofmy1), Specialistläkare, ST
Godkänd av: Anneli Fagerberg, (annfa26), Chefläkare

Giltig från: 2025-11-19

Giltig till: 2027-11-19

Vårdhygien – Förebyggande åtgärder vid hantering av injektionsläkemedel

Gäller även för Capio Lundby Specialistsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Habilitering & Hälsa samt Sjukhusen i väster och är godkänd av respektive chefläkare. Kan även appliceras i primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän.

Förändringar sedan föregående version

Ersätter tidigare version daterad 2025-05-23. Endast redaktionella förändringar.

Bakgrund och syfte

Syftet med rutinen är att förhindra vårdrelaterad blodburen smittspridning via injektionsläkemedel i flerdosbehållare.

Utförande

- **Engångsspruta ska aldrig återfyllas.** Detta gäller även vid tillförsel av upprepade doser till en och samma patient.
- Infusionsset och injektorsprutor som är engångsprodukter ska aldrig användas till flera patienter. Detta gäller även om kopplingsstycke med backventil används.
- Läkemedel i endosampuller/endossprutor ska användas i första hand. I de fall läkemedlet endast finns tillgängligt i flerdosbehållare ska beredningen ske i läkemedelsrummet. Om läkemedel i flerdosbehållare måste hanteras utanför läkemedelsrum ska överblivet läkemedel kasseras direkt efter användande hos enskild patient.

- Vid genomspolning av intravenös infart med natriumklorid 9 mg/ml ska **enbart** endos plastampull alternativt från tillverkare färdigställd endosspruta användas.
- Vid beredning av läkemedel med natriumklorid 9 mg/ml ska endos plastampull alternativt endosbehållare användas. Eventuella rester kasseras efter det att beredning färdigställts.

Avsteg

Medvetet avsteg från denna rutin dokumenteras i patientjournal om avsteg är kopplat till patient. Annan orsak till avsteg rapporteras i MedControl PRO eller befintligt avvikelssystem.

Ansvar

Linjechefer ansvarar för att denna rutin är känd och följs av alla medarbetare.

Relaterad information

Kunskapsöversikt

[Blodburen smitta, Smittöverföring, smittrisker, rutiner](#). Vårdhandboken.

Information från Läkemedelsverket, 5:2011 (sid. 7). Flerpatientanvändning av slangsystem och sprutor vid kontraströntgen kan innebära risker. Uppsala: Läkemedelsverket; 2011.

Arbetsgrupp

Representanter arbetsgrupp Vårdhygien SU

Jessica Ikonen, hygiensjuksköterska

Sofia Myhrman, hygienläkare

Godkänt av

Capio Lundby Specialistsjukhus

Carlanderska sjukhuset

Habilitering & Hälsa

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sjukhusen i väster

Inger Holm Gunnarsson, chefläkare

Karin Möller, chefläkare

Anne-Berit Ekström, chefläkare

Anneli Fagerberg, chefläkare

Philipp Meijering, chefläkare

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Innehållsansvar: Nahid Kondori, (nahko1), Enhetschef

Granskad av: Sofia Myhrman, (sofmy1), Specialistläkare, ST

Godkänd av: Anneli Fagerberg, (annfa26), Chefläkare

Dokument-ID: SU9992-381335686-90

Version: 17.0

Giltig från: 2025-11-19

Giltig till: 2027-11-19