




Inför operation av kronisk öroninflammation

Öron-, näs- och halsmottagningen
Högsbo närsjukhus

Kronisk öroninflammation

Kronisk öroninflammation är vanligen en följd av tidigare akuta öroninflammationer. Det finns två skäl att operera, det ena är hörsel förbättring och det andra är att få ett torrt öra.

Kronisk öroninflammation är en skada i mellan-örats vävnader, som vanligen orsakat av infektioner. Detta kan ha skadat de delar av örat som leder ljudet in till hörselsnäckan. Skadan kan bestå av hål på trumhinnan och/eller skada på hörselbenen.



Operationsmetoder

De två operationsmetoder som används är lagning av trumhinnan (myringoplastik) och lagning av hörselbenen (ossikuloplastik).

Myringoplastik

Vid myringoplastik repareras det hål som finns på trumhinnan. Vid operationen lagas trumhinnan, oftast med en bit muskelhinna eller brosk.

Ossikuloplastik

Vid ossikuloplastik repareras hörselbenskedjan. Antingen används ditt eget ben eller titan.

Operationen

Operationen görs i narkos eller i lokalbedövning. Ingreppet görs antingen bakom örat eller genom hörselgången. I hörselgången

läggs tamponader indränkta i salva. Ett förband läggs över örat. Vanligen går du hem samma dag som operationen.

Efter operationen

Oftast avlägsnas förband, tamponader och eventuella stygn efter två veckor. Läkningen fortsätter under 2–3 månader och hörsselförbättringen tar ofta samma tid. Återbesök sker vanligen efter två veckor samt cirka sex veckor efter operationen.

Skötsel av det opererade örat

Efter operationen ska du undvika vatten i örat innan läkningen är helt klar. De första tre veckorna efter operationen ska kraftig fysisk ansträngning undvikas liksom att tryckutjämna i örat.

Komplikationer

Alla kirurgiska ingrepp innebär ett litet risktagande. Vid öronkirurgi kan detta medföra att hörseln efter operationen blir sämre. Förändring av smaksinnet på tungspetsen eller på sidan av tungan förekommer, men är vanligtvis övergående. Har man mycket sus i örat kan detta öka efter operationen men återgår vanligen till samma nivåer som innan operationen.

Förväntat resultat

Efter myringoplastik, cirka 85 procent läkt och heltrumhinna.

Efter operation av hörselbenen, ossiculoplastik, 60–70 procent chans till påtaglig hörsselförbättring.

Sjukskrivning

Du blir vid behov sjukskriven 1–2 veckor efter operationen.

Kontakt

Kontakta oss gärna i första hand via 1177.

Telefonnummer:

Frågor gällande operationstid: 031-342 53 57

Frågor till vårdpersonal: 031-342 52 34

Telefontider

Måndag–torsdag kl. 07.30–16.00

Fredag kl. 07.15–12.00

(Lunchstängt kl. 12.00 – 13.00)

Besöksadress

Öron-, näs- och halsmottagningen

Högsbo närsjukhus

Lilla Kapplandsgatan 10, Västra Frölunda