

Sjukhusen i väster
Alingsås lasarett
2025-05-19

Smärtlindring Barn

Så här tar du dina smärtstillande tabletter/mixtur efter dagkirurgisk operation

Återhämtning och sårhäkning går bättre om man kan börja röra på sig så snart som möjligt efter operationen. Det är därför viktigt att du förebygger smärta genom att ta de ordinerade smärtstillande tabletterna de första dagarna efter operationen.

De läkemedel som är förkryssade kan användas:

- Paracetamol (ex Alvedon, Panodil) dosering enligt barnets vikt.** Nästa gång klockan _____
Kan ges 4 gånger/dygn var 6:e timma
- Ibuprofen(ex Ipren, Ibumetin) dosering enligt barnets vikt** Nästa gång klockan _____
Kan ges 3 gånger/dygn var 8:e timma
- Tablett **OxyContin** _____ mg Tag 1 tablett i kväll vid läggdags och 1 i morgon bitti.
(Långverkande morfin som tas var 12:e timma, OBS starkt vanebildande!)
- Tablett **Oxycodone 5 mg/ Kapsel OxyNorm 5 mg** Vid behov. Max 1 tablett var 6:e timma.
(Snabbverkande morfin, OBS starkt vanebildande!)
- _____

Du har även **E Recept** att hämta på Apoteket

Ja Nej