

Alingsås lasarett

Kirurgi-, ortopedi- och urologimottagning

Läkemedel inför operation AL

Allmänt

Som regel fortsätter du att ta dina läkemedel fram till operation, men gör ett uppehåll på operationsdagens morgon. Ta med dina läkemedel (inklusive inhalatorer) till operationsavdelningen. Väl hos oss får du vidare instruktioner.

Blodförtunnande läkemedel

Om du äter något av följande läkemedel: Waran, Eliquis, Lixiana, Pradaxa, Xarelto eller tar sprutor som Klexane, Fragmin eller Innohep ska du kontakta din AK-mottagning (eller den läkare som ordinerat/sköter denna behandling) minst två veckor före operation för särskilda anvisningar.

Trombocythämmande läkemedel

Om du behandlas med Trombyl, Magnecyl, Treo, Aspirin, Bamy, Tiplo eller Acetylsalicylsyra (hämmar funktionen av blodplättar/trombocyter) fortsätter du med behandlingen fram till operation, men gör uppehåll på operationsdagens morgon och tar med dina läkemedel till operationsavdelningen.

Om du behandlas med Plavix, Clopidogrel, Cloriocard, Grepid skall du göra ett **uppehåll fem dagar** inför operation – inklusive uppehåll på operationsdagens morgon. Samtidig behandling med två trombocythämmande läkemedel och/eller med läkemedlen Brilique eller Efient **innebär en ökad blödningsrisk under operation** eller vid ryggbedövning. I den händelse du och din operatör (kirurg, ortoped, urolog, gynekolog, öronläkare) inte diskuterat dessa läkemedel i detalj ber vi dig att kontakta operationskoordinatören.

Diabetes

Om du har diabetes ska du två dagar inför operation göra uppehåll med dina diabetestabletter. Om du behandlas med insulin tar du på operationsdagen inget snabbverkande insulin eller mixinsulin, men däremot ordinarie dos långverkande insulin. Om du får insulinkänning skall du dricka söt saft. Under operation kommer vi att kunna kontrollera ditt blodsocker vid behov.