

## Kolposkopi - AL

Kolposkopi görs om du har eller har haft cellförändringar och/eller en HPV-infektion. Undersökningen behövs för att veta om du behöver behandling eller inte. Det är därför viktigt att du kommer på ditt besök. Mer information kan du läsa på: [www.cellprov.se](http://www.cellprov.se) eller [www.1177.se](http://www.1177.se)

### Viktig information inför undersökningen

Om du använder blodförtunnande medel som till exempel Waran, Trombyl, Persantin eller Plavix är det mycket viktigt att du uppger detta när du kommer för ditt besök.

### Så här går undersökningen till

Läkaren börjar med att ta ett cellprov. Därefter tittar läkaren på livmodertappen med hjälp av ett kolposkop. Ett kolposkop är ett specialmikroskop där man kan titta på livmodertappen i stark förstoring. Efter inspektion penslas livmodertappen med två olika lösningar. Först med en ättikslösning, vilket ibland kan ge en svidande känsla. Därefter med en jodlösning som man inte brukar uppleva något obehag av. Beroende på vad läkaren ser tas vid behov ett par mindre vävnadsprover från livmodertappen. I samband med provtagning kan du uppleva en smärta som kan liknas vid menstruationsvärk.

### Bra att veta efter undersökningen

- Första dagen bör du ta det lugnt och inte utöva ansträngande fysisk aktivitet.
- Det är vanligt med en lättare blödning efter undersökningen. Detta är helt normalt och avtar inom 1 vecka.
- Jodlösningen som penslas på livmodertappen är brunfärgad, vilket gör att du kan få en brunaktiga flytningar ett par dagar.
- Undvik samlag, bad och att använda tampong så länge som det blöder, på grund av risk för infektion.

- Vävnadsprov som tas skickas för mikroskopisk undersökning. Det kan ta upp till 8 veckor innan svaret anländer. Besked får du via brev eller enligt överenskommelse.

### Smärta/smärtstillande

Under första veckan kan du ha lättare ömhet i underlivet eller smärta som påminner om menstruationsvärk. Smärtlindring rekommenderas i form av Paracetamol (ex. Alvedon/Panodil). Vid behov kan ytterligare smärtstillande behövas, så som Ibuprofen eller Voltaren.

### Uppföljning

Tidpunkt för uppföljningen beror på vad vävnadsprovet visar. Information om detta får du i samband med provsvar.

### Kontakt

Komplikationer efter undersökningen är ovanliga, men om du får besvär, såsom större blödning, illaluktande flytning, feber eller kraftig smärta, ring dagtid i första hand till Gynekologimottagningen.

Kvällar och helger ringer du till sjukvårdsupplysningen, telefon 1177.

Vid akuta besvär, sök direkt till en gynekologisk akutmottagningen, t ex på SÄS i Borås, NÄL i Trollhättan eller Sahlgrenska i Göteborg, som är öppen dygnet runt.