

Angereds närsjukhus
Endoskopimottagningen

Gastroskopi ANS

Se över dina läkemedel

Tar du något av dessa läkemedel?

- **Waran, Apekumarol** eller **Warfarin**? Då ska du *senast 7 dagar före* undersökningen kontakta din AK-mottagning eller behandlande läkare för utsättande av läkemedlet.
- **Brilique, Clopidogrel, Cloriocard, Efiend, Gripid, Plavix** eller **Ticlid**? Då ska du *senast 5 dagar före* undersökningen kontakta din behandlande läkare för att diskutera utsättande av läkemedlet inför undersökningen.
- **Eliquis, Lixiana, Pradaxa** eller **Xarelto**? Då ska du *1 dag före* undersökning göra uppehåll med läkemedlet inför undersökningen.
- **Acetylsalisylsyra, Fragmin, Innohep, Klexane** eller **Trombyl**? Då ska du inte ta läkemedlet *samma dag* som du gör undersökningen.

Insulin


Om du har diabetes som behandlas med insulin ska du meddela oss. Du som har diabetes får oftast göra din undersökning tidigt på dagen.

Övriga läkemedel

Övriga läkemedel ska du ta som vanligt fram till och på undersökningsdagen. Men du ska ta dem *minst 2 timmar före* undersökningen.

Smärtlindring och avslappnande läkemedel och bilkörning

Ibland kan avslappnande och/eller smärtstillande läkemedel behövas under undersökningen. Efter undersökningen får du inte framföra fordon i trafik på 1 dygn. Därför är det viktigt att du i god tid planerar hur du ska ta dig hem efter undersökningen.



Med hjälp av ett gastroskop kan matstrupen (1), magsäcken (2) och övre delen av tunntarmen (3) undersökas.

Gastroskopi

Gastroskopi är en undersökning av matstrupe, magsäck och tunntarm. Undersökningen görs med hjälp av ett böjligt instrument som kallas gastroskop. Instrumentet leds ner till magsäcken genom munnen. Undersökaren granskar tarmslemhinnan, kan ta prover och genomföra olika behandlingar om det skulle behövas. Om du vill veta mer om gastroskopi kan du läsa om det på Vårdguiden 1177.

Varför görs gastroskopi?

Det finns många anledningar till att din läkare vill göra en gastroskopi. Det kan till exempel vara att du lider av sura uppstötningar, svårigheter att svälja, illamående, kräkningar, magsmärtor eller viktminskning.

För att undersökningen ska bli bra är det mycket viktigt att magsäcken är helt tom. Därför får du inte äta fast föda 6 timmar före undersökningen och inte dricka 2 timmar före undersökningen.

Läkemedel kan vara undantagna – läs mer om läkemedel på sida 1.

Hur går undersökningen till?

Du får lokalbedövning (spray) i munhålan före undersökningen. Det gör undersökningen lättare att genomföra. Undersökningen tar några få minuter. I samband med gastroskopi kan det också bli aktuellt att ta slemhinneprover. I så fall får du information om detta. Oftast får du lämna sjukhuset direkt efter att din undersökning är klar. Men du får inte äta, dricka eller ta några mediciner förrän tidigast 1 timma efter undersökningen. Det beror på att lokalbedövningen som du har fått i halsen kan öka risken för att du sväljer fel.

Komplikationer och risker

Du kan ibland känna obehag i halsen efter undersökningen. Detta är helt normalt och går över efter några dagar. Komplikationer vid en gastroskopi är mycket ovanliga. Om du får ihållande svåra smärtor bakom bröstbenet, i buken eller får blod i avföringen efter undersökningen, ska du söka dig till en akutmottagning.