

## Slyngexcision

Provresultatet visar att du har cellförändringar som behöver behandlas. Behandlingen/ingreppet innebär att man med en slynga tar bort området på livmodertappen där cellförändringarna sitter. Detta görs i lokalbedövning, det vill säga bedövning liknande den man får hos tandläkaren. Besöket görs på gynekologimottagningen och tar i sin helhet cirka 45 minuter. I enstaka fall utförs ingreppet i narkos och görs då på en dagkirurgisk avdelning. Mer information kan du läsa på: [www.cellprov.se](http://www.cellprov.se) eller [www.1177.se](http://www.1177.se)

### Viktig information inför behandlingen

Vid sjukdom eller förhinder av annat slag måste du kontakta gynekologimottagningen snarast. En lättare förkylning behöver inte innebära någon risk, men om du t ex har feber ska du omboka tiden.

- Ta bort eventuella smycken och piercingar före besöket oavsett var på kroppen dessa sitter.
- Ät inte mediciner som innehåller acetylsalicylsyra en vecka före ingreppet, till exempel Albyl, Bamyl eller Treo, då dessa medför ökad blödningsrisk.
- **Använder du blodförtunnande medel är det mycket viktigt att du ringer mottagningen i samband med att du får din kallelse till besöket.**

### Bra att veta efter behandlingen

- Du bör ta det lugnt och inte göra fysiskt ansträngande aktiviteter på behandlingsdagen.
- Det är vanligt med en lättare blödning efter behandlingen. Detta är helt normalt och avtar inom 1–2 veckor.
- Det bildas en liten sårskorpa på livmodertappen där cellförändringarna tagits bort. Sårskorpan brukar lossna efter 10–14 dagar och i samband med detta kan du få en ny blödning.
- För att undvika infektion och för att sårytan ska få läka, ska du undvika samlag, bad och att använda tampong de första 4 veckorna.
- Efter behandlingen kommer menstruationen oftast på väntad tid.
- Vävnadsprov som tas skickas för mikroskopisk undersökning. Det kan ta upp till 8 veckor innan svaret anländer. Besked får du via brev.

### Smärta/smärtstillande

Under första veckan kan du ha lättare ömhet i underlivet eller smärta som påminner om menstruationsvärk. Smärtlindring rekommenderas i form av Paracetamol (ex. Alvedon/Panodil). Vid behov kan ytterligare smärtstillande behövas, så som Ibuprofen eller Voltaren.

### Återbesök

Du kommer bli kallad för ett återbesök efter behandlingen. Tidpunkt för återbesöket beror på vad vävnadsprovet visar. Information om återbesöket får du i samband med provsvar.

### Kontakt

Komplikationer efter behandlingen är ovanliga, men om du får besvär, såsom **större blödning, illaluktande flytning, feber** eller **kraftig smärta**, ring dagtid i första hand till den Gynekologimottagning som behandlingen utförts på.

Kvällar och helger ringer du till sjukvårdsrådgivningen, telefon **1177**.

Du kan också söka direkt till en gynekologisk akutmottagning vid t ex Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.