

Kolposkopi

Kolposkopi görs om du har eller har haft cellförändringar och/eller en HPV-infektion. Vid en kolposkopi kan man fastställa om du har cellförändringar och i så fall vilken grad av cellförändringar det är. Det är därför viktigt att du kommer på ditt besök. Mer information finns på webbplatsen: www.1177.se

Viktig information inför undersökningen

- Undersökningen kan inte genomföras om du har riklig menstruation på besöksdagen.
- Om du är gravid måste du kontakta mottagningen. Cellförändringar kontrolleras alltid på kvinnokliniken Sahlgrenska. Vi behöver därför snarast få veta vilken graviditetsvecka du är i enligt senast menstruation eller beräknad förlossning enligt ultraljud.
- Om du använder blodförtunnande läkemedel som till exempel Waran, Trombyl, Persantin eller Plavix är det mycket viktigt att du uppger detta innan du kommer på ditt besök. Kontakta mottagningen för rådgivning.

Så här går undersökningen till

Läkaren börjar med att ta ett cellprov. Därefter tittar läkaren på livmodertappen med hjälp av ett kolposkop. Ett kolposkop kan liknas vid ett slags mikroskop där man kan titta på livmodertappen i stark förstoring. Efter inspektion penslas livmodertappen med två olika lösningar. Först med en ättikslösning, vilket ibland kan ge en svidande känsla. Därefter med en jodlösning som man inte brukar uppleva något obehag av. Beroende på vad läkaren ser tas vid behov ett par mindre vävnadsprover från livmodertappen. I samband med provtagning kan du uppleva en smärta som kan liknas vid menstruationsvärk.

Bra att veta efter undersökningen

- Första dagen bör du ta det lugnt och inte utöva ansträngande fysisk aktivitet.

- Det är vanligt med en lättare blödning efter behandlingen. Detta är helt normalt och avtar inom 1 vecka.
- Jodlösningen som penslas på livmodertappen är brunfärgad, vilket gör att du kan få en brunaktiga flytningar ett par dagar.
- Undvik samlag, bad och att använda tampong så länge som det blöder, på grund av risk för infektion.
- Vävnadsprov som tas skickas för mikroskopisk undersökning. Det kan ta upp till 8 veckor innan svaret anländer. Besked gällande provsvar får du via brev eller enligt överenskommelse.

Smärta/smärtstillande

Under första veckan kan du ha lättare ömhet i underlivet eller smärta som påminner om menstruationsvärk. Smärtlindring rekommenderas i form av paracetamol (ex. Alvedon/Panodil). Vid behov kan ytterligare smärtstillande behövas, såsom Ibuprofen eller Voltaren.

Uppföljning

Tidpunkt för uppföljningen beror på vad vävnadsprovet visar. Information om detta får du i samband med provsvar.

Vid eventuella komplikationer

Komplikationer efter undersökningen är ovanliga, men om du får besvär, såsom större blödning, illaluktande flytning, feber eller kraftig smärt, kontakta dagtid i första hand gynekologimottagningen.

Kvällar och helger ringer du till 1177.

Vid akuta besvär, åk till gynekologisk akutmottagning t ex vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg som är öppet dygnet runt.