



Urologimottagningen, Kungälv's sjukhus

## Förberedelser

Vid besöket kommer läkaren att undersöka din prostata.

Undersökningen görs med hjälp av ultraljud via ändtarmen. För att undersökningen ska vara möjlig måste ändtarmen rengöras. Det gör du genom att ta Microlax (ett litet lavemang som finns att köpa på apoteket) ca 2 timmar före undersökningen.

Om du äter blodförtunnande medicin kan särskilda instruktioner gälla – kontakta oss på urologmottagningen. Äter du Trombyl påverkas du ej av detta.

### **Så går undersökningen och provtagningen till:**

Du får ligga ned på sidan med lätt böjda knän. Läkaren börjar med att känna på prostatan med fingret. Därefter förs en ultraljudsstav in några centimeter i ändtarmen. Prostatan kan då ses på en bildskärm.

Via ultraljudsstaven kan läkaren också ta vävnadsprover (biopsi) från prostatan. Med en fin nål läggs en lokalbedövning runt prostatan, varpå 10–12 prover/biopsier tas.

Hela undersökningen tar 10 – 15 minuter. Biopsierna skickas sedan för analys. Svaret kommer efter ca en månad.

Efter provtagningen

Efter provtagningen är det vanligt att man kan få en del mindre obehag, såsom blod i urinen, sädesvätskan eller avföringen. Dessa symtom är ofarliga och brukar gå över på någon dag eller en vecka. Blod i sädesvätskan kan förekomma upp till någon månad.

Drick rikligt – det minskar risken för urinvägsinfektion. Skulle blödningen vara kraftig bör du kontakta sjukhuset.

#### Urinvägsinfektion och/eller feber

För att minska risken för urinvägsinfektion får du i samband med provtagning med provtagningen antibiotikaproylax, 1 tablett. Om du trots detta skulle få feber och/eller vattenkastningsbesvär bör du snarast kontakta urologmottagningen. Vid tider då urologmottagningen inte är öppen kontaktar du akutmottagningen.

#### Kontakt

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till oss på telefonnummer 0303-98635