Patientinformation

Läkemedel inför din operation

Allmänt

Som regel fortsätter du att ta dina läkemedel fram till operation, men gör ett uppehåll på operationsdagens morgon. Ta med dina läkemedel (inklusive inhalatorer) till operationsavdelningen. Väl hos oss får du vidare instruktioner.

Blodförtunnande läkemedel

Vi vill att du gör **uppehåll** med följande blodförtunnande i **48 timmar inför operation** för att kroppens blodstillande förmåga skall återställas:

- Waran®
- Eliquis®
- Lixiana®
- Pradaxa®
- Xarelto®

Det finns tillstånd där även så kort behandlingsuppehåll som 48 timmar kan öka risken för blodpropp. I sådana fall inleder man behandling med blodförtunnande sprutor inför operation. **Du behöver stämma av med den läkare eller mottagning som sköter om din blodförtunnande behandling** för att få information om du behöver överbryggande behandling med blodförtunnande sprutor! Detsamma gäller om du redan idag behandlas med blodförtunnande sprutor (som Klexane®, Fragmin® eller Innohep®).

Trombocythämmande läkemedel

Om du behandlas med Trombyl®/Magnecyl/Treo/Aspirin/Bamyl/Tiplo/Acetylsalicylsyra (hämmar funktionen av blodplättar/trombocyter) fortsätter du med behandlingen fram till operation, men gör uppehåll på operationsdagens morgon och tar med dina läkemedel till operationsavdelningen.

Om du behandlas med Plavix®/Clopidogrel/Cloriocard/Grepid® skall du göra ett **uppehåll fem dagar** inför operation – inklusive uppehåll på operationsdagens morgon.

Samtidig behandling med två trombocythämmande läkemedel och/eller med läkemedlen Brilique® eller Efient® innebär en **ökad blödningsrisk under operation** eller vid ryggbedövning. I den händelse du och din operatör (kirurg, ortoped, urolog, gynekolog, öronläkare) inte diskuterat dessa läkemedel i detalj ber vi dig att kontakta operationskoordinatorn!

Diabetes

Om du har diabetes ska du två dagar inför operation göra uppehåll med dina diabetestabletter. Om du behandlas med insulin tar du på operationsdagen inget snabbverkande insulin eller mixinsulin, men däremot ordinarie dos långverkande insulin. Om du får insulinkänning skall du dricka söt saft. Under operation kommer vi att kunna kontrollera ditt blodsocker vid behov.